



Les spécialités actuellement commercialisées

**AOD : les anticoagulants oraux directs**

### Points clés à retenir

- **Rapidité d'action** (délai d'action de l'ordre de quelques heures pour les AOD contre quelques jours pour les AVK)
- **Courte durée d'action** (plusieurs heures pour les AOD contre plusieurs jours pour les AVK)
- **Pas de moyen de gestion des risques**

**Nombreux schémas posologiques  
=  
Source potentielle d'erreur**

- **Jamais plus de 2 prises par jour**  
= pas de posologie supérieure à deux prises par jour
- **Jamais plus de 2 comprimés ou gélules par prise**

### Risque majeur avec les AOD

= **risque hémorragique. Mais aussi le risque thrombotique** notamment en cas de défaut d'observance du patient

### Votre rôle en tant qu'infirmier(e) :

- Repérer les **sujets à risques** : patient de faible poids, patient âgé, patient insuffisant rénal.
- Connaître les **signes d'hémorragies** (alerter médecin rapidement)


Apixaban (Eliquis®)	Rivaroxaban (Xarelto®)	Dabigatran (Pradaxa®)
La prise d'un cp écrasé* doit être suivie d'un grand verre d'eau <small>(* écrasement non documentée!)</small>	Au cours d'un repas La prise d'un cp écrasé* doit être suivie d'une prise d'aliments <small>(* source = RCP)</small>	Ne pas ouvrir, ni mâcher les gélules
 L'écrasement d'un comprimé induit une perte de principe actif et peut modifier la biodisponibilité du médicament		

Recommandations pour l'administration en cas de difficultés à avaler

### Recommandations pour les relais d'anticoagulants

Afin de ne pas exposer les patients à un risque hémorragique majoré **respecter les recommandations suivantes** :

- L'association d'un AOD avec un AVK est toujours **TRANSITOIRE**,
- L'association de **deux AOD est CONTRE-INDIQUÉE**,
- L'association d'un **AOD avec un anticoagulant injectable** (HNF, HBPM) **est CONTRE-INDIQUÉE**



Oubli d'une prise : conduite à tenir

Utiliser un [pilulier hebdomadaire](#) :

Conserver dans l'emballage plastique ("blistre"), découper la plaquette et **ne pas mettre l'AOD "en vrac"** car il est sensible à la lumière et à l'humidité (dabigatran).

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Association médicamenteuses déconseillées, il ne faut pas associer un AOD (apixaban, dabigatran, rivaroxaban) avec :

- **AIS = Anti-inflammatoire stéroïdien** (ex : corticoïdes) sauf si courte durée
- **AINS = Anti-inflammatoire non stéroïdien** (ex : ibuprofène, ...) sauf si courte durée
- **Antiagrégant plaquettaire stéroïdien** (ex : aspirine, prasugrel, Clopidogrel, Ticagrelor, ... ) possible dans certains cas
- **Certains médicaments à visée cardiaque** : Amiodarone, Vérapamil, Quinidine, ... possible avec **ADAPTATION POSOLOGIQUE**
- **Antifongique azolé**
- **Millepertuis...**




HAD Mutualiste  
Mutualité Française Charente  
4 Chemin de Frégeneuil  
CS 72504 Soyaux  
16025 ANGOULEME Cedex

Tel.: 05 45 20 51 00 / Fax : 05 45 94 23 15

## LES NEVER EVENTS (2)

Prise en charge des patients sous anticoagulants AOD

### Règle des 5 B



HOSPITALISATION A DOMICILE