

MESURE DE LA GLYCEMIE CAPILLAIRE



DOM-RP-PROT26-V2 Date d'application: 04/06/2025

I. OBJET ET/OU OBJECTIFS

Ce protocole a pour objectif de décrire la technique de mesure de la glycémie capillaire d'une personne soignée à domicile.

II. DOMAINES D'APPLICATION ET PERSONNES CONCERNÉES

Ce protocole s'applique aux services HAD et SSIAD

- Infirmier Libéraux,
- Infirmier de coordination.

	Rédigé par :	Vérifié par :	Approuvé par :
Nom:	Angélique FUMERON IDE encadrant HAD	Claire BRONCY Infirmière hygiéniste	Monique DELAGE Médecin praticien en HAD
Date :	15/05/2025	15/05/2025	15/05/2025
Visa:	*	a fronter	Delap

III. DÉROULEMENT DE L'ACTIVITÉ

Matériel:

- ✓ 1 lecteur de glycémie capillaire accompagné de son mode d'emploi et de bandelettes,
- √ 1 auto-piqueur,
- ✓ Lancettes à usage unique adaptées à l'auto-piqueur,
- ✓ Savon liquide ou solution hydroalcoolique,
- ✓ Collecteur à aiguilles.

Recommandations:

- ✓ Lire le mode d'emploi de l'auto-piqueur.
- ✓ Ne jamais utiliser d'alcool sur la peau de la personne soignée avant de piquer (modification du résultat).
- ✓ Piquer uniquement sur les côtés des doigts (pour garder la sensibilité).
- ✓ Ne jamais piquer ni le pouce ni l'index (protéger la préhension).
- ✓ Procéder à une nouvelle mesure de la glycémie capillaire si le résultat est inhabituel.
- ✓ Le lecteur de glycémie capillaire doit subir un contrôle chaque mois. Vérifier la date du dernier contrôle effectué et le renouveler si nécessaire.

Méthode:

- ✓ Faire laver les mains ou laver les mains de la personne soignée au savon + eau chaude puis rincer et sécher soigneusement.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains.
- ✓ Mettre des gants à usage unique.
- ✓ Adapter la lancette à l'auto-piqueur à chaque utilisation.
- ✓ Piquer le doigt et laisser la goutte de sang se former.
- ✓ Déposer la goutte de sang sur la bandelette.
- ✓ Suivre le mode d'emploi du lecteur de glycémie.
- ✓ Essuyer le doigt avec une compresse ou coton.
- ✓ Eliminer le matériel souillé.
- ✓ Oter les gants à usage unique.
- ✓ Pratiquer une hygiène des mains.

Transmissions

- ✓ Dans le DPI en HAD
 - Validation du soin.
 - > Renseigner le résultat
- ✓ Dans le carnet de surveillance glycémique du patient en SSIAD
 - > Le site d'injection.
 - > Résultat de la glycémie
- ✓ Informer l'IDEC et le médecin traitant de tout problème urgent.

IV. ANNEXES

TECHNIQUE D'INJECTION D'INSULINE

NATURE DES MODIFICATIONS					
Version	Date	Objet de la modification			
1	16/03/2021	Création du protocole (remplace HAD-RP01- PR002-PR0T01-V2)			
2	15/05/2025	Actualisation (remplace HAD-RP-PROT22-V1)			