

CONSEILS D'UTILISATION

des chimiothérapies orales



Se laver soigneusement les mains **AVANT** et **APRÈS** chaque manipulation des comprimés.



La dose prescrite doit être administrée par voie orale avec **un grand verre d'eau**, en position assise pour réduire le risque d'irritations gastro-intestinales. Si vous ne pouvez pas avaler ces comprimés, demander conseil à votre médecin ou pharmacien.



En cas d'oubli, ne pas prendre la dose oubliée, ne pas doubler la dose suivante. Prendre la dose habituellement prescrite le jour suivant et noter l'oubli dans le carnet de suivi.



Ne jamais arrêter le traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.



Ne pas laisser à la portée des enfants.



Ne pas broyer, écraser, couper les comprimés, **ne pas mettre dans un pilulier.**



Ne pas jeter les emballages ni les comprimés dans votre poubelle. À rapporter à votre pharmacien.



Éviter de manger des **pamplemousses** ou de boire du jus de pamplemousse ou de la tisane de **millepertuis** le temps du traitement par chimiothérapie orale.



En cas de souillure des draps ou des vêtements (vomissements...), laver le linge souillé immédiatement et séparément, en machine à température élevée (60°C – 90°C).



Il est conseillé d'uriner en position assise pour éviter une contamination accidentelle.



Contacter votre médecin immédiatement en cas de :

- Signes infectieux (fièvre, toux, frissons....),
- Apparition de selles noires, de saignements de nez, de crachats comportant du sang,
- Gonflement, rougeur, douleur au niveau d'un membre, de difficultés à respirer ou de toux anormale.