

DCI	SPECIALITES	FORME GALENIQUE	BROYAGE OUVERTURE	SONDE ENTERALE	EXPLICATIONS REMARQUES	ALTERNATIVES	INDICATIONS
ABACAVIR 300 mg	ZIAGEN	COMPRIME PELLICULE SECABLE		OUI	Mélangeable à une petite quantité de nourriture ou de liquide		Antiviraux à action directe
ABACAVIR / DOLUTEGRAVIR / LAMIVUDINE 600/50/300 mg (Triumeq)	TRIUMEQ	COMPRIME PELLICULE VIOLET		NON	Ne pas croquer, ne pas macher, ne pas écraser		Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
ABACAVIR / LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE 300/150/300 mg (Trizivir)	TRIZIVIR	COMPRIME PELLICULE BLEU VERT		NON	Ne pas croquer, ne pas macher, ne pas écraser		Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
ACAMPROSATE 333 mg (Aotal)	AOTAL	COMPRIME GASTRORESISTANT		NON	Ne pas croquer, ne pas macher, ne pas écraser		Médicaments des troubles de l'addiction
ACARBOSE 50 et 100 mg (Glucor)	GLUCOR	COMPRIME		OUI	Ecrasement possible		Hypoglycémiants autres que les insulines
ACEBUTOLOL 200 et 400 mg (Sectral)	SECTRAL	COMPRIME PELLICULE		NON	Ne pas croquer, ne pas macher, ne pas écraser		Beta-bloquants
ACENOCOUMAROL 1 et 4 mg (Minisintrom, Sintrom)	MINISINTROM SINTROM	COMPRIME		NON	Marge thérapeutique étroite		Antithrombotiques
ACETAZOLAMIDE 250 mg (Diamox)	DIAMOX	COMPRIME SECABLE		OUI	Plus aliment ou sirop de fruit pour cacher l'amertume		Antiglaucomeux et myotiques
ACETYLLEUCINE 500 mg (Tanganil)	TANGANIL	COMPRIME		OUI			Antivertigineux
ACICLOVIR 200 et 800 mg (Zovirax)	ZOVIRAX	COMPRIME		NON	Interdit d'écraser	SOLUTION BUvable 200mg/5ml	Antiviraux à action directe
ACIDE ALENDRONIQUE / CHOLECALCIFEROL 70/2800 et 70/5600 UI (Fosavance)	FOSAVANCE	COMPRIME		NON	Principe actif très irritant pour la muqueuse. 30 min avant la prise d'aliments ou de boissons (lait). Risque d'oesophagite, administration en position debout ou assise		Médicaments affectant la structure et la minéralisation
ACIDE ALENDRONIQUE 10 et 70 mg (Fosamax)	FOSAMAX	COMPRIME		NON	Principe actif très irritant pour la muqueuse. 30 min avant la prise d'aliments ou de boissons (lait). Risque d'oesophagite, administration en position debout ou assise		Médicaments affectant la structure et la minéralisation
ACIDE CLODRONIQUE 520 et 800 mg (Clastoban, Lytos)	CLASTOBAN LYTOS	COMPRIME PELLICULE		NON	A administrer avec de l'eau, en dehors des repas, pas de laitage		Médicaments affectant la structure et la minéralisation
ACIDE FOLINIQUE 5 et 25 mg (Folinoral)	FOLINORAL	GELULE		OUI			Médicaments détoxifiants dans un traitement cytostatique
ACIDE FOLINIQUE 5, 15 et 25 mg (Lederfoline)	LEDERFOLINE	COMPRIME		OUI Date d'application : 03/04/2023	A diluer dans de l'eau, ne pas mélanger avec d'autres produits		Médicaments détoxifiants dans un traitement cytostatique

ACIDE FOLIQUE 0,4 et 5 mg (<i>Speciafoldine</i>)	SPECIAFOLDINE	COMPRIME		OUI			Acide folique et dérivés
ACIDE FUSIDIQUE 250 mg (<i>Fucidine</i>)	FUCIDINE	COMPRIME		OUI	Principe actif amer, administration immédiate	Préférer Fucidine enfant 250mg/5ml suspension buvable	Antibactériens stéroïdiens
ACIDE MEFENAMIQUE 250 mg (<i>Ponstyl</i>)	PONSTYL	GELULE		NON	Pas d'étude		AINS
ACIDE NIFLUMIQUE 250 mg (<i>Nifluril</i>)	NIFLURIL	GELULE		OUI	Goût désagréable	Préférer Nifluril suppositoire	AINS
ACIDE PARA-AMINOSALICYLIQUE 4 g (<i>Granupas</i>)	GRANUPAS	GRANULES GASTRORESISTANTS		NON	Peut être mélanger à un jus d'orange ou de tomate, de la compote ou un yaourt tant que les granulés restent intacts		Antituberculeux
ACIDE RISEDRONIQUE 5, 30, 35 et 75 mg (<i>Actonel</i>)	ACTONEL	COMPRIME		NON	30 minutes avant la prise d'aliments ou de boissons (lait). Risque d'oesophagite		Médicaments affectant la structure et la minéralisation
ACIDE TIAPROFENIQUE 100 et 200 mg (<i>Surgam</i>)	SURGAM	COMPRIME SECABLE		OUI	Avaler tel quel ou dissout dans de l'eau. Ne pas prendre à jeun		AINS
ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg (<i>Exacyl</i>)	EXACYL	COMPRIME PELLICULE		NON	Pas de données	Exacyl 0,5mg/5ml ampoules buvables ou Exacyl 1mg/10ml solution buvable	Antifibrinolytiques
ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 200 mg (<i>Ursolvan</i>)	URSOLVAN	GELULE		NON	A prendre pendant le repas		Traitement de la vésicule biliaire
ACIDE URSODESOXYCHOLIQUE 250 et 500 mg (<i>Cholurso, Delursan</i>)	CHOLURSO DELURSAN	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant le repas		Traitement de la vésicule biliaire
ACITRETINE 10 et 25 mg (<i>Soriatane</i>)	SORIATANE	GELULE		NON	PA tératogène. A prendre de préférence pendant les repas ou avec du lait. Principe actif très photosensible, administrer dans la seconde suivant l'ouverture		Médicament contre le psoriasis à usage systémique : rétinoïdes pour le traitement du psoriasis
ADEFOVIR 10 mg (<i>Hepsera</i>)	HEPSERA	COMPRIME		NON	Ecrasement déconseillé car pas d'étude.		Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique
AFATINIB 20, 30, 40 et 50 mg (<i>Giotrif</i>)	GIOTRIF	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe, 1h avant ou 3h après les repas. Peut être dispersé sans l'écraser dans environ 100 ml d'eau plate (aucun autre liquide ne doit être utilisé) et administré moins de 15 minutes avant dispersion.		Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
AGOMELATINE 25 mg (<i>Valdoxan</i>)	VALDOXAN	COMPRIME		NON	Broyage déconseillé car pas d'étude (Servier 28-02-2022) A prendre au coucher		Antidépresseurs
ALBENDAZOLE 400 mg (<i>Eskazole, Zentel</i>)	ZENTEL	COMPRIME		OUI	Peut être croqué	Suspension buvable	Antinématodes

ALFACALCIDOL 0,25 0,5 et 1 µg (<i>Un-alfa</i>)	UN ALFA	CAPSULE MOLLE		NON		Solution buvable	Vitamines A et D, y compris en association
ALFUZOSINE LP 10 mg	XATRAL	COMPRIME LP		NON	A prendre le soir après le repas		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate
ALIMEMAZINE 5 mg	THERALENE	COMPRIME SECABLE		NON	Ecrasement déconseillé en l'absence de données	Solutions buvables et gouttes	Antihistaminiques à usage systémique : Dérivés de la phénothiazine
ALLOPURINOL 100, 200, et 300 mg	ZYLORIC	COMPRIME		NON	A prendre après les repas pour améliorer la tolérance - Peut être dispersé dans 10 ml d'eau si besoin		Médicaments contre la goutte : inhibiteur de la synthèse de l'acide urique
ALPRAZOLAM 0,25 mg et 0,50 mg	XANAX	COMPRIME		OUI	PFIZER 04-08-2020 : écrasement déconseillé car hors AMM. Des études de bioeq et de stabilité sont favorables au broyage et à la mise en suspension		Anxiolytiques : dérivés des BZD
ALTIZIDE / SPIRONOLACTONE 25/15 mg (<i>Aldactazine</i>)	ALDACTAZINE	COMPRIME SECABLE		NON	A éviter de préférence en fin de journée		Diurétiques et épargneurs potassiques
ALTRETAMINE 100mg	HEXASTAT	GELULE		NON	PA cytotoxique, poudre irritante, ne pas ouvrir pour éviter tout contact		Autres antinéoplasiques
ALVERINE/SIMETICONE 60/300mg	METEOSPASMYL DOLOSPASMYL	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre au début des repas ou au moment des douleurs		Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux
AMANTADINE 100mg	MANTADIX	CAPSULE MOLLE		NON		Sirop	Dopaminergiques : dérivés de l'adamantane
AMBENONIUM 10 mg (<i>Mytelase</i>)	MYTELASE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence pendant ou en fin de repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Parasympathomimétiques : anticholestérasiques
AMILORIDE / HYDROCHLOROTHIAZIDE 5/50mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	Teva 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Diurétiques épargneurs potassiques en association
AMIODARONE 200mg	CORDARONE	COMPRIME SECABLE		OUI	Eviter le jus de pamplemousse	Très peu hydrosoluble	Antiarythmiques de classe I et III : antiarythmique classe III
AMISULPRIDE 100, 200 et 400 mg (<i>Solian</i>)	SOLIAN	COMPRIME		NON	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable	Antipsychotiques : benzamides
AMITRIPTYLINE 25 et 50 mg (<i>Elavil, Laroxyl</i>)	LAROXYL	COMPRIME		NON	Teofarma 08-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Sensible à l'humidité et goût amer	Solution buvable	Antidépresseurs : inhibiteur non-sélectif de la recapture des monoamines
AMLODIPINE / INDAPAMIDE 1,5/5 et 1,5/10 mg (<i>Natrixam LM</i>)	NATRIXAM LM	COMPRIME LM		NON	A prendre de préférence le matin. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques et diurétiques
AMLODIPINE / PERINDOPRIL 5/5, 5/10, 10/5 et 10/10 mg (<i>Coveram</i>)	COVERAM	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le matin à jeun. Eviter le jus de pamplemousse.Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et angiotensine en association : IEC et inhibiteur des canaux calciques

AMLODIPINE / VALSARTAN 5/80, 5/160 et 10/160 mg (<i>Exforge</i>)	EXFORGE	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP		Antagonistes de l'angiotensine II et inhibiteurs des canaux calciques
AMLODIPINE 5 et 10 mg (<i>Amlor</i>)	AMLOR	GELULE		OUI	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse. Pfizer 04-08-2020 : des études de bioeq et de stabilité sont favorables à la dispersion dans un liquide sucré ou une compote si administration immédiate. Peu hydrosoluble.		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
AMOXICILLINE / ACIDE CLAVULANIQUE 500/62,5 mg (<i>Augmentin</i>)	AUGMENTIN	COMPRIME		NON	A prendre de préférence au début des repas.	sachet	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines : pénicillines associées à un inhibiteur des bêta lactamases
AMOXICILLINE 500 mg (<i>Clamoxyl</i>)	CLAMOXYL	GELULE		NON		Poudre pour suspension buvable, comprimés de 1 g dispersibles	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines : pénicillines à large spectre
ANASTROZOLE 1 mg (<i>Arimidex</i>)	ARIMIDEX	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe (uniquement pour favoriser l'observance).	<u>Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude, mais le comprimé est petit et généralement avalé sans difficulté. Peu hydrosoluble.	Anti-hormones et apparentés : Inhibiteurs de l'aromatase
ANETHOLTRITHIONE 12,5 et 25 mg (<i>Sulfarlem</i>)	SULFARLEM	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.	Non	Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme
APIXABAN 2,5 et 5 mg (<i>Eliquis</i>)	ELIQUIS	COMPRIME		OUI	Les comprimés écrasés sont stables dans l'eau, le glucose à 5%, le jus ou la compote de pomme pendant au moins 4 heures. Eviter le jus de pamplemousse.	Non	Antithrombotiques : inhibiteurs directs du facteur Xa
APREPITANT 80 et 125 mg (<i>Emend</i>)	EMEND	GELULE		NON		Poudre pour suspension buvable	Antémétiques et antinauséux
ARIPIRAZOLE 5, 10 et 15 mg (<i>Abilify</i>)	ABILIFY	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse. (<i>Thériaque 01/2022</i>)	Comprimés orodispersibles, solution buvable	Antipsychotiques
ARTEMETHER / LUMEFANTRINE 20/120 mg (<i>Riamet</i>)	RIAMET	COMPRIME		OUI	A prendre au cours des repas ou avec une boisson lactée pour améliorer l'absorption. Eviter le jus de pamplemousse.	Non	Antipaludéens : artémisine et dérivés en association
ARTENIMOL / PIPERAQUINE 40/320 mg (<i>Eurartesim</i>)	EURARTESIM	COMPRIME		OUI	Les comprimés écrasés peuvent être mélangés à de l'eau. A prendre ≥ 3h après le dernier repas et ne pas manger pendant ≤ 3h après la prise.	Non	Antipaludéens : artémisine et dérivés en association
ATAZANAVIR 150, 200 et 300 mg (<i>Reyataz</i>)	REYATAZ	GELULE		NON	Eviter le jus de pamplemousse.	Non	Antiviraux à action directe : inhibiteurs de protéase
ATENOLOL / CHLORTALIDONE 50/12,5 mg (<i>Tenoretic</i>)	TENORETIC	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe. AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Non	Bétabloquants et thiazidiques
ATENOLOL / NIFEDIPINE 50/20 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	GELULE LP		NON	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe.	Non	Bétabloquants et autres associations

ATENOLOL 50 et 100 mg (Tenormine)	TENORMINE	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe. AstraZeneca 02-10-2020 : pas d'étude mais possible en cas de besoin si administration immédiate. Hydrosoluble et amer.	Non	Bétabloquants sélectifs
ATORVASTATINE 10, 20, 40, 80 mg (Tahor)	TAHOR	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse. <i>Ecrasable selon laboratoire. Pfizer 04-08-2020 : écrasement déconseillé mais une étude est favorable à la mise en suspension, bien qu'elle soit moins bien tolérée. Peu hydrosoluble et photosensible.</i>		Agents réduisant les lipides sériques - Inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase
ATOVAQUONE / PROGUANIL 62,5/25 et 250/100 mg (Malarone)	MALARONE	COMPRIME		OUI	A administrer à heure fixe pendant les repas ou avec une boisson lactée pour améliorer l'absorption.	Non	Antipaludéens : biguanides
AZATHIOPRINE 25 et 50 mg (Imurel)	IMUREL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON (cf remarques)	PA cytotoxique. Mieux toléré si pris pendant les repas, sans prendre de lait ni produits laitiers (≥ 1h avant ou ≥ 2h après). Ne pas diviser le comprimé en deux sauf cas particuliers (cf RCP). ASPEN Pharma 22-02-2022 : non-écrasable car cytotoxique. Peut être dispersé dans 10 mL d'eau en 5 min pour administration par SNG.	Non	Immunosuppresseurs
AZITHROMYCINE 250 et 600 mg (Zithromax, Azadose)	ZITHROMAX	COMPRIME		OUI	<u>Pfizer 04-08-2020</u> : pas d'étude mais pas d'opposition à l'écrasement si administration immédiate. Le pelliculage masque le goût amer. Photosensible.	Comprimés dispersibles, poudre pour suspension buvable	Macrolides
BACLOFENE 10 mg (Lioresal)	LIORESAL	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.	Solution buvable (AAC)	Myorelaxants à action centrale
BAMBUTEROL 10 mg (Oxeol)	OXEOL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant le coucher. <u>AstraZeneca 06-04-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Non	Agonistes sélectifs des récepteurs beta2adrénergiques
BENAZEPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 10/12,5 mg (Cibadrex)	CIBADREX	COMPRIME SECABLE		NON	En attente (Viatis)	Non	IEC et diurétiques
BENAZEPRIL 5 et 10 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	En attente (Viatis)	Non	IEC
BENZYLTHIOURACILE 25 mg (Basdene)	BASDENE	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Non	Antithyroïdiens : thiouraciles
BETA-CAROTENE / MYRTILLE EXTRAIT ANTHOCYANOSIDIQUE 5/100 mg (Difrarel)	DIFRAREL	COMPRIME		NON	<i>Biocodex 25-02-2022 : peut être écrasé si besoin, mais mauvais goût.</i>	Non	Stabilisateurs des capillaires
BETAHISTINE 8, 16 et 24 mg (Serc, Betaserc, Lectil)	SERC BETASERC LECTIL	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance.	Non	Antivertigineux
BETAXOLOL 20 mg (Kerlone)	KERLONE	COMPRIME		NON		Non	Bétabloquants sélectifs

BEZAFIBRATE 200 mg (Befizal)	BEFIZAL	COMPRIME		OUI	A prendre de préférence pendant les repas. Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais des études suggèrent sur un écrasement possible. Goût amer.	Non	Agents réduisant les lipides sériques : fibrates
BEZAFIBRATE LP 400 mg (Befizal LP)	BEFIZAL LP	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas.	Non	Agents réduisant les lipides sériques : fibrates
BICALUTAMIDE 50 mg (Casodex)	CASODEX	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe (uniquement pour favoriser l'observance) Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Très peu hydrosoluble..	Non	Antihormones et apparentés : antiandrogènes
BIPERIDENE LP 4 mg (Akineton LP)	AKINETON LP	COMPRIME		NON	A prendre le matin.	Non	Anticholinergiques : Amines tertiaires
BISACODYL 5 mg (Contalax, Dulcolax)	CONTALAX DULCOLAX	COMPRIME		NON	PA irritant.	Suppositoires	Laxatifs de contact
BISOPROLOL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 2,5/6,25 ; 5/6,25 et 10/6,25 mg (Lodoz)	LODOZ	COMPRIME		NON	A prendre le matin.		Bétabloquants sélectifs et thiazidiques
BISOPROLOL 1,25 ; 2,5 ; 3,75 ; 5 ; 7,5 et 10 mg (Cardensiel, Detensiel)	CARDENSIEL DETENSIEL	COMPRIME		NON	A prendre le matin.	Merck 05-08-2020 : pas d'étude, écrasement possible en cas de nécessité si administration immédiate. Goût amer.	Bétabloquants sélectifs
BOSENTAN 65,5 et 125 mg (Tracleer)	TRACLEER	COMPRIME PELLICULE		NON	Ecrasement déconseillé car pas d'étude	comprimés dispersibles	Antihypertenseurs pour l'hypertension artérielle pulmonaire
BROMAZEPAM 1,5 et 6 mg (Lexomil)	LEXOMIL	COMPRIME SECABLE		NON	Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Anxiolytiques BZD
BROMELAÏNES 900 nK (Extranase)	EXTRANASE	COMPRIME		NON			Autres médicaments des troubles musculo-squelettiques- ENZYMES
BROMOCRIPTINE 2,5 mg (Parlodel)	PARLODEL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. Eviter le jus de pamplemousse.		Dopaminergiques
BROMOCRIPTINE 5 et 10 mg (Parlodel)	PARLODEL	GELULE		OUI	A prendre pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. Eviter le jus de pamplemousse.		Dopaminergiques

BUDESONIDE 3 et 9 mg (Entocort, Mikicort)	ENTOCORT MIKICORT	GELULE		NON	A prendre en une seule prise le matin		Anti-inflammatoires intestinaux- Corticostéroïdes locaux
BUMETANIDE 1 et 5 mg (Burinex)	BURINEX	COMPRIME		OUI	<u>Alloga 21-04-2022</u> : écrasement possible si administration immédiate. Photosensible, peu soluble et légèrement amer.		Diurétiques de l'anse : Sulfamides non associés
BUSULFAN 2 mg (Myleran)	MYLERAN	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. Manipuler les comprimés avec précaution et éviter autant que possible un contact prolongé avec la main. Aspen Pharma 22-02-2022 : des protocoles existent pour réaliser un sirop à partir des comprimés, en suivant les précautions d'usage de manipulation des produits cytotoxiques.		Alkylants : sulfonates d'alkyle
CAFEINE / ERGOTAMINE 100/1 mg (Gynergene caféine)	GYNERGENE CAFEINE	COMPRIME			Eviter le jus de pamplemousse.	En attente (Centre de Specialites Pharmaceutiques)	Antimigraineux : Alcaloïdes de l'ergot de seigle
CALCITRIOL 0,25 µg (Rocaltrol)	ROCALTROL	CAPSULE MOLLE		NON			Vitamines A et D, y compris en association : vitamine D et analogues
CALCIUM / CHOLECALCIFEROL 600 mg / 400 UI (Caltrate vitamine D3)	CALTRATE VIT D	COMPRIME A SUCER		OUI	A prendre à distance des repas	écrasement possible si besoin	Calcium en association avec vitamine D et/ou d'autres médicaments
CALCIUM CARBONATE 600 mg (Caltrate)	CALTRATE	COMPRIME A SUCER		OUI	A prendre à distance des repas	<u>GSK 15-02-2022</u> : écrasement possible si besoin	Calcium
CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 8/12,5 et 16/12,5 mg (Hytacand)	HYTACAND	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe.	<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Antagonistes de l'angiotensine II en associations
CANDESARTAN 4, 8, 16 et 32 mg (Atacand)	ATACAND	COMPRIME		NON	<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Antagonistes de l'angiotensine II non associés
CAPECITABINE 150 et 500 mg (Xeloda)	XELODA	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. A prendre 30 min après les repas	<u>Roche 21-02-2022</u> : écrasement déconseillé, risque d'effets indésirables (cf RCP)	Antimétabolites : Analogue de la pyrimidine
CAPTOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/25 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le matin ou à heure fixe. Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations
CAPTOPRIL 25 et 50 mg (Lopril)	LOPRIL	COMPRIME SECABLE			A prendre de préférence le matin ou à heure fixe Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.	Solution buvable	Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
CARBAMAZEPINE 200 mg (Tegretol)	TEGRETOL	COMPRIME SECABLE		NON	Eviter le jus de pamplemousse. Médicament à marge thérapeutique étroite	Suspension buvable	Antiépileptiques : Dérivés du carboxamide
CARBAMAZEPINE LP 200 et 400 mg (Tegretol LP) HAD-RP-DOC12-V1	TEGRETOL LP	COMPRIME SECABLE LP		NON Date d'application : 03/04/2023	Eviter le jus de pamplemousse. Médicament à marge thérapeutique étroite	⚠ Non LP ⚠ Suspension buvable	Antiépileptiques, Dérivés du carboxamide

CARBIMAZOLE 5 et 20 mg (<i>Neo-mercazole</i>)	NEOMERCAZOLE	COMPRIME		NON	Ecrasable selon HUG 07/2020		Antithyroïdiens Dérivés imidazolés soufrés
CARVEDILOL 6,25 ; 12,5 et 25 mg (<i>Kredex</i>)	KREDEX	COMPRIME SECABLE		NON	Ecrasable selon HUG 07/2020. A prendre à heure fixe, au moment des repas pour améliorer la tolérance. Ecrasement déconseillé car pas d'étude (Cheplapharm 14-03-2022)		Bétabloquants
CEFALEXINE 500 et 1000 mg (<i>Keforal</i>)	KEFORAL	COMPRIME		NON	A prendre de préférence en dehors des repas. Ne pas prendre avec du lait. Ecrasement déconseillé car pas d'étude. Goût désagréable (Sciencex 07-04-2022)	Suspension buvable	Autres antibactériens betalactamines. Cephalosporines de première génération
CEFIXIME 200 mg (<i>Oroken</i>)	CEFIXIME	COMPRIME		NON	Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude donc déconseillé. La raison du pelliculage est indisponible.	Poudre pour suspension buvable	Autres antibactériens betalactamines. Cephalosporines de troisième génération
CEFPODOXIME 100 mg (<i>Orelox</i>)	ORELOX	COMPRIME		NON	Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude donc écrasement déconseillé. Le pelliculage masque le goût amer. Photosensible. A prendre pendant les repas	Poudre pour solution buvable	Autres antibactériens betalactamines. Cephalosporines de troisième génération
CEFUROXIME 125, 250 et 500 mg (<i>Zinnat</i>)	ZINNAT	COMPRIME		NON	A prendre après les repas pour améliorer l'absorption.	Granulés pour suspension buvable	Autres antibactériens betalactamines. Cephalosporines de deuxième génération
CELECOXIB 100 et 200 mg (<i>Celebrex</i>)	CELEBREX	GELULE		OUI	A prendre de préférence à heure fixe. Peut être vidé sur de la nourriture semi-solide (compote, yaourt, purée) et avalé immédiatement avec un verre d'eau.		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens. Coxibs
CELIPROLOL 200 mg (<i>Celectol</i>)	CELECTOL	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le matin ≥ 30 min avant ou ≥ 2h après les repas. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Bétabloquants sélectifs
CETIRIZINE 10 mg (<i>Zyrtecset</i>)	ZYRTECSET	COMPRIME		NON	UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable en gouttes, comprimés à sucer	Antihistaminiques à usage systémique. Dérivés de la pipérazine
CHLORAMBUCIL 2 mg (<i>Chloraminophène</i>)	CHLORAMINOPHENE	GELULE		NON	A prendre à jeun. PA cytotoxique. Gélule non ouvrable		Alkylants : Analogues des moutardes azotées
CHLOROQUINE 100 mg (<i>Nivaquine</i>)	NIVAQUINE	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre en fin de repas, de préférence le matin ou le midi. Mélangeable à un yaourt ou un liquide sucré.		Antipaludéens. Aminoquinolines
CHLORPROMAZINE 25 et 100 mg (<i>Largactil</i>)	LARGACTIL	COMPRIME SECABLE		NON	Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable en gouttes	Antipsychotiques, phénothiazines à chaînes latérale aliphatique
CHONDROITINE 400 mg (<i>Chondrosulf</i>)	CHONDROSULF	GELULE		NON	A prendre de préférence pendant les repas.	Gel oral	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens
CIBENZOLINE 130 mg (<i>Exacor</i>)	EXACOR	COMPRIME SECABLE		NON	Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données		Antiarythmiques de classe I et III

CICLOSPORINE 10, 25, 50 et 100 mg (<i>Neoral</i>)	NEORAL	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable	Immunosuppresseurs : inhibiteurs de la calcineurine
CINACALCET 30, 60 et 90 mg (<i>Mimpara</i>)	MIMPARA	COMPRIME		NON	A prendre pendant ou en fin de repas.	Granulés en gélule ouvrable	Antiparathyroïdiens
CIPROFIBRATE 100 mg (<i>Lipantor</i>)	LIPANOR	GELULE		NON	Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : fibrates
CIPROFLOXACINE 250, 500 et 750 mg (<i>Ciflox</i>)	CIFLOX	COMPRIME SECABLE		NON	Ne pas prendre avec des produits laitiers ou boissons enrichies en calcium. Bayer 03-08-2020 : broyage déconseillé car goût amer. Peut être utilisé en SNG.	Granulés pour suspension buvable	Quinolones antibactériennes : fluoroquinolones
CITALOPRAM 20 mg (<i>Seropram</i>)	SEROPRAM	COMPRIME SECABLE		NON	Goût amer et photosensibilité. 'Lundbeck 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable	Antidépresseurs Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
CLARITHROMYCINE 250 et 500 mg (<i>Zeclar</i>)	ZECLAR	COMPRIME		NON	En attente (Viatris)	Granulés pour suspension buvable	Macrolides, lincosamides et streptogramines
CLARITHROMYCINE LM 500 mg (<i>Génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME LM		NON	A prendre de préférence pendant les repas, Arrow 15-03-2022 : augmentation du risque de survenue candidose, glossite ou stomatite en cas d'écrasement.	Pas d'équivalent LM	Macrolides, lincosamides et streptogramines
CLINDAMYCINE 75, 150 et 300 mg (<i>Dalacine</i>)	DALACINE	GELULE		NON	Ne convient pas aux enfants qui ne peuvent pas avaler les gélules entières.		Macrolides, lincosamides et streptogramines
CLOBAZAM 10 et 20 mg (<i>Urbanyl</i>)	URBANYL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé dans une compote de pommes.	Suspension buvable	Anxiolytiques (BZD)
CLOBAZAM 5 mg (<i>Urbanyl</i>)	URBANYL	GELULE		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude	Suspension buvable, comprimés écrasables	Anxiolytiques (BZD)
CLOFAZIMINE 50 et 100 mg (<i>Lamprène</i>)	LAMPRENE	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre au cours des repas ou avec du lait.		Antilépreux
CLOMIPRAMINE 10, 25 et 75 mg (<i>Anafranil</i>)	ANAFRANIL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	<u>Alfasigma 08-04-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Antidépresseurs Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
CLONAZEPAM 2 mg (<i>Rivotril</i>)	RIVOTRIL	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable en gouttes	Antiépileptiques (BZD)
CLONIDINE 0,15 mg (<i>Catapressan</i>)	CATAPRESSAN	COMPRIME SECABLE		NON	<u>CSP 21-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer, PA soluble dans l'eau et l'alcool.		Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central, Agonistes des récepteurs de l'imidazoline

CLOPIDOGREL 75 et 300 mg (<i>Plavix</i>)	PLAVIX	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Sanofi 14-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude + risque accru d'effet indésirable. Photosensible et goût amer.		Antithrombotiques : Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines
CLORAZEPATE 5, 10 et 20 mg (<i>Tranxene</i>)	TRANXENE	GELULE		NON	Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude		Anxiolytiques (BZD)
CLOXACILLINE 500 mg (<i>Orbenine</i>)	ORBENINE	GELULE		NON	A prendre de préférence 30 min avant les repas.		Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines, Pénicillines résistantes aux bêta-lactamases
CLOZAPINE 25 et 100 mg (<i>Leponex</i>)	LEPONEX	COMPRIME SECABLE		OUI			Antipsychotiques : Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines
COBICISTAT / ELVITEGRAVIR / EMTRICITABINE / TENOFOVIR 150/150/200/245 mg (<i>Stribild</i>)	STRIBILD	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillé car pas d'étude interne, mais d'autres études ont montré une bioeq et tolérance similaire après écrasement.		Antiviraux à action directe : antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
CODEINE / EXTRAIT DE GRINDELIA / SULFOGAÏACOL 25/20/100 mg (<i>Neocodion</i>)	NEOCODION	COMPRIME		NON	<u>Bouchara-Recordati 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Sirop	Antitussifs, sauf associations avec des expectorants : alcaloïdes de l'opium et dérivés
COLCHICINE / OPIUM / TIEMONIUM 1/12,5/50 mg (<i>Colchimax</i>)	COLCHIMAX	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre au moment des repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Médicaments contre la goutte
COLCHICINE 1 mg (<i>Colchicine opocalcium</i>)	COLCHICINE	COMPRIME		OUI	Eviter le jus de pamplemousse.		Médicaments contre la goutte
CYAMEMAZINE 25 et 100 mg (<i>Tercian</i>)	TERCIAN	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable en gouttes	Antipsychotiques : Phénothiazines à chaîne latérale aliphatique
CYANOCOBALAMINE 250 µg (<i>Vitamine B12</i>)	VITAMINE B12	COMPRIME SECABLE		OUI	Substipharma 21-03-2022 : pas d'étude mais écrasement possible si administration immédiate. Photosensible et sensible à l'humidité. Peu soluble dans l'eau.	Solution buvable	Vitamine B12 et acide folique : cyanocobalamine et dérivés
CYCLOPHOSPHAMIDE 50 mg (<i>Endoxan</i>)	ENDOXAN	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. A prendre le matin à jeun avec 2 grands verres d'eau.		Alkylants : analogues des moutardes azotées
CYPROHEPTADINE 4 mg (<i>Periactine</i>)	PERIACTINE	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le soir (effet sédatif). Teofarma 08-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.		Antihistaminiques à usage systémique
CYPROTERONE 50 et 100 mg (<i>Androcur</i>)	ANDROCUR	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre pendant ou en dehors des repas mais de façon constante, de préférence le repas du matin ou du soir. Bayer 03-08-2020 : pas d'étude, peut être écrasé mais ne pas diluer.		Anti-androgènes

CYSTEAMINE 50 et 150 mg (<i>Cystagon</i>)	CYSTAGON	GELULE		OUI	Mélanger la poudre à des aliments comme le lait, les pommes de terre et autres produits à base d'amidon. Eviter les boissons acides comme le jus d'orange.		Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme : acides aminés et dérivés
DABIGATRAN 75, 110 et 150 mg (<i>Pradaxa</i>)	PRADAXA	GELULE		NON	Risque de surdosage et donc de saignements si ouverture de la gélule. Boehringer 18-08-2020 : cf. RCP. Sensible à l'humidité.		Antithrombotiques : inhibiteurs directs de la thrombine
DABRAFENIB 50 et 75 mg (<i>Tafinlar</i>)	TAFINLAR	GELULE		NON	A prendre à heure fixe, ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Ne pas ouvrir les gélules en raison de l'instabilité chimique du PA.	Comprimés dispersibles (AAC)	Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
DANTROLENE 25 et 100 mg (<i>Dantrium</i>)	DANTRIUM	GELULE		NON	A prendre pendant les repas.		Myorelaxants à action directe : dantrolène et dérivés
DAPAGLIFLOZINE 10 mg (<i>Forxiga</i>)	FORXIGA	COMPRIME		NON			Antidiabétiques, insulines exclues : Inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 (SGLT2)
DAPSONE / FER 100/200 mg (<i>Disulone</i>)	DISULONE	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé et mélangé à un liquide ou un yaourt.		Antilépreux
DARUNAVIR 75, 150, 400, 600 et 800 mg (<i>Prezista</i>)	PREZISTA	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe ≤ 30 min après les repas ou une collation. Eviter le jus de pamplemousse.	Suspension buvable	Antiviraux à action directe : inhibiteurs de protéases
DASATINIB 20, 50, 70, 100 et 140 mg (<i>Sprycel</i>)	SPRYCEL	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Ne pas écraser pour préserver le dosage et éviter le risque d'exposition cutanée. Eviter le jus de pamplemousse.	Poudre pour suspension buvable	Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
DEFERASIROX 90, 180 et 360 mg (<i>Exjade</i>)	EXJADE	COMPRIME		OUI	A prendre à heure fixe à jeun ou avec un repas léger. Peut être écrasé dans un yaourt ou une compote pour administration immédiate.		Tous autres médicaments : chélateurs du fer
DESLOXATADINE 5 mg (<i>Aerius</i>)	AERIUS	COMPRIME		NON	<u>MSD 19-09-2020</u> : pelliculage pour masquer le goût amer.	Solution buvable	Antihistaminiques à usage systémique
DEXAMETHASONE 0,5 mg (<i>Dectancyl</i>)	DECTANCYL	COMPRIME		OUI	Peut être mélangé à l'alimentation.	Solution buvable (AAC)	Corticoides à usage systémique non associés : glucocorticoides
DEXCHLORPHENIRAMINE 2 mg (<i>Polaramine</i>) HAD-RP-DOC12-V1	POLARAMINE	COMPRIME SECABLE		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre de préférence le soir (effet sédatif). Bayer 30-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antihistaminiques à usage systémique alkylamines substituées

DIAZEPAM 2, 5 et 10 mg (Valium)	VALIUM	COMPRIME SECABLE		?	Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable en gouttes	Anxiolytiques (BZD)
DIAZOXIDE 25 et 100 mg (Proglidem)	PROGLICEM	GELULE		OUI	Mélangeable avec des aliments.	Suspension buvable (AAC)	Tous autres médicaments : médicaments de l'hypoglycémie
DICLOFENAC 25 et 50 mg (Voltarene)	VOLTARENE	COMPRIME GR		NON	A prendre de préférence pendant les repas.	Suppositoires	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens
DICLOFENAC LP 75 et 100 mg (Voltarene LP)	VOLTARENE LP	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas.	⚠ Non LP ⚠ Suppositoires	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens
DIETHYLCARBAMAZINE 100 mg (Notezine)	NOTEZINE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence après les repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antinématodes : pipérazine et dérivés
DIGOXINE 0,125 et 0,25 mg (Hemigoxine, Digoxine)	HEMIGOXINE DIGOXINE	COMPRIME		NON	<u>Teofarma 08-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	Solution buvable en gouttes	Glycosides cardiotoniques : glycosides de la digitale
DIHYDROCODEINE LP 60 mg (Dicodin LP)	DICODIN LP	COMPRIME LP		NON			Opioides : alcaloïdes naturels de l'opium
DILTIAZEM 60 mg (Tildiem)	TILDIEM	COMPRIME		NON	A prendre de préférence au début des repas. Eviter le jus de pamplemousse. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude, administration immédiate si écrasé. Sensible à la lumière et l'humidité.		Inhibiteurs calciques cardiosélectifs : Dérivés de la benzothiazépine
DILTIAZEM LP 200 et 300 mg (Mono Tildiem LP)	MONOTILDIEM LP	GELULE LP		NON	A prendre à heure fixe. Eviter le jus de pamplemousse. Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude		
DILTIAZEM LP 90 et 120 mg (Bi Tildiem LP)	BITILDIEM LP	GELULE LP		NON		Gélules LP ouvrables	Inhibiteurs calciques cardiosélectifs : Dérivés de la benzothiazépine
DIMENHYDRINATE / CAFEINE 50/10 mg (Mercalm)	MERCALM	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre 30 min avant le départ. Peut être écrasé dans un verre d'eau sucrée.	Sirop (sans caféine)	Antémétiques et antinauséeux
DIOSMINE 500, 600 et 1000 mg (Daflon, Diovenor, Mediveine)	DIOVENOR	COMPRIME		NON	Peut être dissout sans l'écraser dans de l'eau. A prendre peandant les repas.	Poudre pour suspension buvable	Stabilisateurs des capillaires : bioflavonoïdes
DIPHENHYDRAMINE 90 mg (Nautamine)	NAUTAMINE	COMPRIME		OUI	A prendre 30 min avant le départ. Peut être écrasé dans un verre d'eau.		Antihistaminiques à usage systémique

DIPYRIDAMOLE 75 mg (Persantine)	PERSANTINE	COMPRIME		NON	<u>CSP 21-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer, PA très peu soluble dans l'eau mais soluble en milieu acide, et présumé photosensible.		Antithrombotiques :Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines
DISOPYRAMIDE 100 mg (Rythmodan)	RYTHMODAN	GELULE		NON	<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude. Peu soluble dans l'eau.		Antiarythmiques de classe I et III
DISOPYRAMIDE LP 125 et 250 mg (Isorhythm LP)	ISORYTHM LP	GELULE		NON			Antiarythmiques de classe I et III
DISOPYRAMIDE LP 250 mg (Isorhythm LP)	ISORYTHM LP	COMPRIME LP		NON			Antiarythmiques de classe I et III
DISULFIRAME 500 mg (Espanal)	ESPERAL	COMPRIME		NON	A prendre le matin pendant les repas, après ≥ 24h d'abstinence d'alcool. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Médicaments des troubles de l'addiction : médicaments utilisés en cas de dépendance à l'alcool
DOLUTEGRAVIR 10, 25 et 50 mg (Tivicay)	TIVICAY	COMPRIME		NON	La biodisponibilité des comprimés dispersibles est 1,6 fois supérieure à celle des comprimés pelliculés.	Comprimés dispersibles ⚠ Adaptation posologique ⚠	Antiviraux à action directe
DOMPERIDONE 10 mg (Motilium)	MOTILIUM	COMPRIME		NON	A prendre de préférence avant les repas (absorption plus rapide). Eviter le jus de pamplemousse.	Comprimés orodispersibles, suspension buvable	Propulsifs
DONEPEZIL 5 et 10 mg (Aricept)	ARICEPT	COMPRIME		NON	A prendre avant le coucher. Eviter le jus de pamplemousse.	Comprimés orodispersibles	Médicaments contre la démence
DOSULEPINE 25 mg (Prothiaden)	PROTHIADEN	GELULE		NON	<u>Teofarma 08-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude.		Antidépresseurs :Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines
DOSULEPINE 75 mg (Prothiaden)	PROTHIADEN	COMPRIME		NON	<u>Teofarma 08-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Antidépresseurs :Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines
DOXYCYCLINE 50 et 100 mg (Doxo, Doxypalu, Doxylis, Granudoxo)	DOXY, DOXYPALU, GRANUDOXY, DOXYLIS	COMPRIME SECABLE		NON	Peut être dissout sans l'écraser dans ½ verre d'eau. A prendre pendant les repas. Ne pas s'allonger jusqu'à 1 h après la prise (risque d'ulcération de l'oesophage). Ne pas prendre avec du lait (diminue l'absorption).		Tétracyclines

DULOXÉTINE 30 et 60 mg (<i>Cymbalta</i>)	CYMBALTA	GELULE GR		NON	<u>Lilly 06-08-2020</u> : la gélule contient des comprimés GR. Peut être dissout dans de l'eau avec stabilité de 30 min.		Antidépresseurs
DUTASTERIDE 0,5 mg (<i>Avodart</i>)	AVODART	CAPSULE MOLLE		NON	PA irritant pour la muqueuse oropharyngée. Ne pas faire manipuler par une femme enceinte. 'GSK 02-10-2020 : cf. RCP. Goût amer.		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate : inhibiteurs de la 5 alpha-réductase
DYDROGESTERONE 10 mg (<i>Duphaston</i>)	DUPHASTON	COMPRIME		OUI	A prendre de préférence à heure fixe.		Progestatifs
EFAVIRENZ / EMTRICITABINE / TENOFOVIR 600/200/245 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME		?	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance.	Efavirenz gélule ouvrable, Emtricitabine granulés et Tenofovir solution buvable	Antiviraux à action directe : Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
EFAVIRENZ 50, 100 et 200 mg (<i>Sustiva</i>)	SUSTIVA	GELULE		OUI	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance. Peut être administré immédiatement dans une petite quantité de nourriture (1-2 cuillères à café). Ne pas manger pendant ≤ 2 heures après.		Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique
EFAVIRENZ 600 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	A prendre en dehors des repas et de préférence le soir pour améliorer la tolérance.	Gélules ouvrables	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique
ELETRIPTAN 20 et 40 mg (<i>Relpax</i>)	RELPAK	COMPRIME		NON	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.		Antimigraineux : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1
ELTROMBOPAG 25, 50 et 75 mg (<i>Revolade</i>)	REVOLADE	COMPRIME		NON	Ne pas consommer ≤ 4h avant ou ≤ 2h après la prise d'Eltrombopag de lait et produits laitiers, d'antiacides ni de compléments minéraux (fer, calcium, magnésium, zinc, sélénium, aluminium...).	Poudre pour suspension buvable	Vitamine K et autres hémostatiques
EMTRICITABINE / RILPIVIRINE / TENOFOVIR 200/25/245 mg (<i>Eviplera</i>)	EVIPLERA	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude.		Antiviraux à action directe : Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
EMTRICITABINE / TENOFOVIR 200/245 mg (<i>Truvada</i>)	TRUVADA	COMPRIME		OUI	A prendre de préférence pendant les repas. Peut être écrasé ou délité dans un verre d'eau, de jus d'orange ou de raisin. Administration immédiate.	Solution buvable de Tenofovir et granulés d'Emtricitabine	Antiviraux à action directe : Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
EMTRICITABINE 200 mg (<i>Emtriva</i>)	EMTRIVA	GELULE		NON	La prise d'une gélule de 200 mg équivaut à la prise de 240 mg via la solution buvable.	Solution buvable ⚠ Adaptation posologique ⚠	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique

ENALAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Co-Renitec)	CORENITEC	COMPRIME		NON	<u>Organon 30-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations
ENALAPRIL 5 et 20 mg (Renitec)	RENITEC	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Organon 30-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
ENTACAPONE 200 mg (Comtan)	COMTAN	COMPRIME		NON	Notice patient : ne pas écraser		Dopaminergiques
ENTECAVIR 0,5 et 1 mg (Baraclude)	BARACLUDE	COMPRIME		NON	Peut nécessiter d'être pris à jeun (≥ 2h à distance des repas) dans les formes compliquées d'hépatite. Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : écrasement déconseillé car pas de données	Solution buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique
EPLERENONE 25 et 50 mg (Inspra)	INSPIRA	COMPRIME		NON	Eviter le jus de pamplemousse.		Diurétiques épargneurs potassiques : antagonistes de l'aldostérone
ERLOTINIB 25, 100 et 150 mg (Tarceva)	TARCEVA	COMPRIME		NON	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Roche 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
ESCITALOPRAM 5, 10, 15 et 20 mg (Seroplex)	SEROPLEX	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON		Solution buvable en gouttes	Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
ESOMEPRAZOLE 20 et 40 mg (génériques)	GENERIQUES	GELULE LR		OUI	Peut être vidé dans ½ verre d'eau plate et administré dans un délai de 30 min. Ne pas utiliser d'autre liquide pour ne pas dissoudre l'enrobage entérique. Ne pas écraser les granulés	Granulés GR	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien :Inhibiteurs de la pompe à protons
ESOMEPRAZOLE 20 et 40 mg (Inexium)	INEXIUM	COMPRIME GR		NON	Peut être dissout sans l'écraser dans ½ verre d'eau plate et administré dans un délai de 30 min. Ne pas utiliser d'autre liquide pour ne pas dissoudre l'enrobage entérique.	Granulés GR	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien :Inhibiteurs de la pompe à protons
ESTERS ETHYLIQUES 90 D'ACIDES OMEGA-3 1000 mg (Omacor)	OMACOR	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Pierre Fabre 21-02-2022 : risque d'oxydation à l'air de l'huile si ouverture		Agents réduisant les lipides sériques, non associés
ESTRAMUSTINE 140 mg (Estracyt)	ESTRACYT	GELULE		NON	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. PA irritant et cytotoxique.		Autres antinéoplasiques
ETAMSYLATE 250 et 500 mg (Dicynone)	DICYNONE	COMPRIME		NON		Solution injectable par voie orale diluée dans ½ verre d'eau	Vitamine K et autres hémostatiques
ETHAMBUTOL 500 mg (Dexambutol)	DEXAMBUTOL	COMPRIME		OUI Date d'application : 03/04/2023	Mélangeable à l'alimentation ou une boisson.		Antituberculeux

ETILEFRINE 5 mg (Effortil)	EFFORTIL	COMPRIME		NON	<u>Serb 22-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable en gouttes	Cardiotoniques sauf les glycosides cardiotoniques : Adrénérergiques et dopaminergiques
ETOPOSIDE 50 mg (Celltop)	CELLTOP	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre à jeun.		Alcaloïdes végétaux et autres produits d'origine naturelle : :Dérivés de la podophyllotoxine
EVEROLIMUS 0,5 ; 0,75 ; 2,5 ; 5 et 10 mg (Votubia, Certican, Afinitor)	VOTUBIA CERTICAN AFINITOR	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe, avec ou sans aliments mais de façon constante. PA cytotoxique. Eviter le jus de pamplemousse.	Comprimés dispersibles	Immunosuppresseurs
EXEMESTANE 25 mg (Aromasine)	AROMASINE	COMPRIME		?	PA tératogène. A prendre à heure fixe, de préférence après les repas.		Antihormones et apparentés : Inhibiteurs de l'aromatase
EXTRAIT DE FEUILLES DE GINKGO BILOBA 40 mg (Tanakan)	TANAKAN	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Ipsen 18-02-2022 : pas d'opposition au broyage hormis le goût amer, ni au mélange avec les boissons ou aliments. PA hydrosoluble, mais certains excipients sont insolubles.	Solution buvable	Médicaments contre la démence
EXTRAIT DE PRUNIER D'AFRIQUE 50 mg (Tadenan)	TADENAN	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre de préférence 30 min avant les repas.		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate
EXTRAIT DU FRUIT DE PALMIER DE FLORIDE 160 mg (Permixon)	PERMIXON	GELULE		NON	A prendre pendant les repas. Pierre Fabre 21-02-2022 : risque d'oxydation et de troubles digestifs si gélule ouverte.		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate
EXTRAIT PURIFIE DE PEPIN DE RAISIN 150 mg (Endotelon)	ENDOTELON	COMPRIME GR		NON	A prendre de préférence en dehors des repas. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Médicaments agissant sur les capillaires
EZETIMIBE 10 mg (Ezetrol)	EZETROL	COMPRIME		NON	<u>Organon 30-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Agents réduisant les lipides sériques, non associés
FAMCICLOVIR 125 et 500 mg (Oravir)	ORAVIR	COMPRIME		?			Antiviraux à action directe : Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse
FELODIPINE LP 5 mg (Flodil)	FLODIL	COMPRIME LP		NON	A prendre le matin en dehors des repas ou après un repas léger, pauvre en graisse et en sucre. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
FENOFIBRATE 145 et 160 mg (Lipanthyl)	LIPANTHYL	COMPRIME		NON			Agents réduisant les lipides sériques, non associés : fibrates
FENOFIBRATE 67 et 200 mg (Lipanthyl micronisé)	LIPANTHYL MICRONISE	GELULE		?	A prendre pendant les repas.		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : fibrates

FIDAXOMICINE 200 mg (Difclir)	DIFICLIR	COMPRIME		NON			Antiseptiques intestinaux
FINASTERIDE 5 mg (Chibro-Proscar)	CHIBROPROSCAR	COMPRIME		NON	Ne pas faire manipuler de comprimé cassé par une femme enceinte. Organon 30-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate : inhibiteurs de la 5 alpha-réductase
FINGOLIMOD 0,25 et 0,5 mg (Gilenya)	GILENYA	GELULE		NON			Immunosuppresseurs
FLECAINIDE 100 mg (Flecaïne)	FLECAINE	COMPRIME SECABLE		?			Antiarythmiques de classe I et III
FLECAINIDE LP 50, 100, 150 et 200 mg (Flecaïne LP)	FLECAINE LP	GELULE LP		NON			Antiarythmiques de classe I et III
FLUBENDAZOLE 100 mg (Fluvermal)	FLUVERMAL	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être croqué pendant les repas.	Suspension buvable	Antinématodes : dérivés du benzimidazole
FLUCONAZOLE 50, 100, 150 et 200 mg (Beagyne, Triflucan)	BEAGYNE TRIFLUCAN	GELULE		NON	A prendre de préférence à heure fixe. Pfizer 04-08-2020 : ouverture déconseillée car hors-AMM. Une étude montre la possibilité d'ouvrir les gélules pour administration en SNG. Peu hydrosoluble.	Poudre pour suspension buvable	Antimycosiques à usage systémique : dérivés triazolés
FLUCYTOSINE 500 mg (Ancotil)	ANCOTIL	COMPRIME SECABLE		OUI	Possibilité de broyer les comprimés si administration immédiate.		Antimycosiques à usage systémique
FLUDROCORTISONE 50 µg (Flucortac)	FLUCORTAC	COMPRIME SECABLE		OUI	A dissoudre dans de l'eau ou du jus de fruit. Administration immédiate car PA sensible à l'humidité.		Corticoïdes à usage systémique non associés : Minéralocorticoïdes
FLUINDIONE 20 mg (Previscan)	PREVISCAN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir. Merck 05-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude d'efficacité + médicament à marge thérapeutique étroite.		Antithrombotiques : antivitamines K
FLUNARIZINE 10 mg (Sibelium)	SIBELIUM	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir (effet sédatif). Janssen 09-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antimigraineux
FLUOXETINE 20 mg (Prozac)	PROZAC	GELULE		NON		Comprimés dispersibles, solution buvable	Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
FLURBIPROFENE 50 et 100 mg (Cebutid)	CEBUTID	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas.		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
FLURBIPROFENE LP 200 mg (Cebutid LP)	CEBUTID	GELULE LP		OUI	A prendre de préférence pendant les repas. Almirall SAS France 09-05-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude d'efficacité, de biodisponibilité, de stabilité et de sécurité. Ne pas écraser les granulés		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
FLUVASTATINE 20 et 40 mg (généralistes)	GENERIQUES	GELULE		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre matin et soir ou seulement le soir.		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)

FLUVASTATINE LP 80 mg (Lescol LP)	LESCOL LP	COMPRIME LP		NON			Agents réduisant les lipides sériques, non associés : Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)
FLUVOXAMINE 50 et 100 mg (Floxyfral)	FLOXYFRAL	COMPRIME SECABLE		NON			Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
FOSAMPRENAVIR 700 mg (Telzir)	TELZIR	COMPRIME		NON	La suspension buvable (mais pas les comprimés) doit être prise à jeun en dehors des repas chez l'adulte, et pendant les repas chez l'enfant ou l'adolescent.	Suspension buvable ⚠ Administration ⚠	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de protéase
FOSINOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Arrow 15-03-2022</u> : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques
FOSINOPRIL 10 et 20 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON	Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association
FUMARATE FERREUX 66 mg (Fumafer)	FUMAFER	COMPRIME		NON	Horaire de la prise à adapter en fonction de la tolérance digestive. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	Solution buvable	Préparations martiales : Préparations orales de fer bivalent
FUROSEMIDE 20, 40, 500 mg (Lasilix faible, Lasilix, Lasilix special)	LASILIX	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc écrasement déconseillé, mais possible en cas de nécessité si administration immédiate. Photosensible.	Solution buvable	Diurétiques de l'anse : Sulfamides non associés
FUROSEMIDE LP 60 mg (Lasilix retard)	LASILIX RETARD	GELULE LP		OUI	A prendre le matin avant le petit-déjeuner. Ne pas écraser les granulés	⚠ Non LP ⚠ Solution buvable	Diurétiques de l'anse : Sulfamides non associés
GABAPENTINE 100, 300 et 400 mg (Neurontin)	NEURONTIN	GELULE		OUI	Goût amer. Pfizer 04-08-2020 : ouvrable si administration immédiate. A mélanger à un aliment pour masquer l'amertume. Une étude indique que l'ouverture n'influe pas sur l'absorption.	Solution buvable (AAC)	Antépiléptiques
GABAPENTINE 600 et 800 mg (Neurontin)	NEURONTIN	COMPRIME SECABLE		NON		Gélules ouvrables, solution buvable (AAC)	Antépiléptiques
GALANTAMINE LP 8, 16 et 24 mg (Reminyl LP)	REMINYL LP	GELULE LP		OUI	A prendre le matin de préférence pendant les repas, avec de l'eau ou un autre liquide. Ne pas écraser les granulés	⚠ Non LP ⚠ Solution buvable	Médicaments contre la démence : Anticholinestérasiques

GLIBENCLAMIDE 2,5 et 5 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre au début des repas. Teva 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable (AAC)	Hypoglycémiantes autres que les insulines : Sulfonylurées
GLICLAZIDE 80 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON			Hypoglycémiantes autres que les insulines : Sulfonylurées
GLICLAZIDE LM 30, 60 mg (<i>Diamicon</i>)	DIAMICRON	COMPRIME LM		NON	A prendre au petit-déjeuner. Ne pas croquer (risque d'hypoglycémie).		Hypoglycémiantes autres que les insulines : Sulfonylurées
GLIMEPIRIDE 1, 2, 3 et 4 mg (<i>Amarel</i>)	AMAREL	COMPRIME		NON	A prendre au début du premier repas principal de la journée. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Hypoglycémiantes autres que les insulines : Sulfonylurées
GLIPIZIDE LP 5 et 10 mg (<i>Ozidia</i>)	OZIDIA	COMPRIME LP		NON	A prendre pendant les repas, en général le petit-déjeuner.		Hypoglycémiantes autres que les insulines : Sulfonylurées
GRANISETRON 1 et 2 mg (<i>Kytril</i>)	KYTRIL	COMPRIME		NON			Antémétiques et antinauséux : Antagonistes de la sérotonine (5-HT3)
HALOPERIDOL 1 et 5 mg (<i>Haldol</i>)	HALDOL	COMPRIME		NON	Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable	Antipsychotiques : Dérivés de la butyrophénone
HEPTAMINOL 187,8 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	<u>Arrow 15-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable en gouttes	Vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques : Autres vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques
HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg (<i>Esidrex</i>)	ESIDREX	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Juvisse Pharmaceuticals 31-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Diurétique low-ceiling et thiazidiques : Thiazidiques non associés
HYDROCORTISONE 10 mg	HYDROCORTISONE	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être mélangé à l'alimentation.		Corticoïdes à usage systémique non associés : Glucocorticoïdes
HYDROMORPHONE LP 4, 8, 16 et 24 mg (<i>Sophidone LP</i>)	SOPHIDONE LP	GELULE LP		OUI	Peut être mélangé dans un aliment semi-solide (purée, confiture, compote, yaourt...). Ne pas dissoudre les granules pour maintenir l'enveloppe gastro-résistante. Administration immédiate. Ne pas écraser les granulés		Opioides : alcaloïdes naturels de l'opium
HYDROQUINIDINE LP 300 mg (<i>Serecor</i>)	SERECOR	GELULE LP		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude		Antiarythmiques de classe I et III : Antiarythmiques, classe Ia

HYDROXYCARBAMIDE 500 mg (<i>Hydrea</i>)	HYDREA	GELULE		OUI	PA cytostatique : en cas d'ouverture porter des gants protecteurs, un masque et éviter toute inhalation ou contact avec la peau ou les muqueuses. Vider la gélule dans un verre d'eau et administrer immédiatement.		Autres antinéoplasiques
HYDROXYCHLOROQUINE 200 mg (<i>Plaquenil</i>)	PLAQUENIL	COMPRIME		NON	A prendre après les repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antipaludéens : Aminoquinolones
HYDROXYZINE 25 mg (<i>Atarax</i>)	ATARAX	COMPRIME SECABLE		NON	Ne pas laisser fondre sous la langue. UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.	Sirop	Anxiolytiques : Dérivés du diphénylméthane
IBUPROFENE / PSEUDOPHEDRINE 200/30 mg (<i>Rhinadvil</i>)	RHINADVIL	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. L'écrasement majore les effets indésirables. GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.		Décongestionnants nasaux à usage systémique : Sympathomimétiques
IBUPROFENE 100, 200 et 400 mg (<i>Advil, Nurofen, etc.</i>)	ADVIL NUROFEN	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.	Comprimés orodispersibles, granulés pour suspension buvable	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
IBUPROFENE 200 et 400 mg (<i>Advilcaps, Nurofencaps</i>)	ADVILCAPS NUROFENCAPS	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre de préférence pendant les repas. L'écrasement majore les effets indésirables. GSK 17-02-2022 : non-écrasable car pas d'étude. Goût amer.	Comprimés orodispersibles, granulés pour suspension buvable	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
IMATINIB 100 et 400 mg (<i>Glivec</i>)	GLIVEC	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. Peut être dispersé sans l'écraser dans un verre d'eau plate ou de jus de pomme (environ 50 mL pour un comprimé de 100 mg, ou 200 mL pour celui de 400 mg). Administration immédiate.		Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
IMIPRAMINE 10 et 25 mg (<i>Tofranil</i>)	TOFRANIL	COMPRIME		?	En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)		Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
INDAPAMIDE 2,5 mg (<i>Fludex</i>)	FLUDEX	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le matin. Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude		Diurétiques low-ceiling sauf les thiazidiques : Sulfamides non associés
INDAPAMIDE LP 1,5 mg (<i>Fludex LP</i>)	FLUDEX LP	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence le matin.		Diurétiques low-ceiling sauf les thiazidiques : Sulfamides non associés
INDOMETACINE 25 mg (<i>Indocid</i>)	INDOCID	GELULE		OUI	A prendre de préférence pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. HAC Pharma 22-02-2022 : ouverture possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	Suppositoires, suspension buvable (AAC)	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide acétique et apparentés
INDOMETACINE 75 mg (<i>Chrono-indocid</i>)	CHRONO-INDOCID	GELULE LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas pour améliorer la tolérance digestive. HAC Pharma 22-02-2022 : ouverture possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur	⚠ Non LP ⚠ Suppositoires, suspension buvable (AAC)	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide acétique et apparentés
HAD-RP-DOC12-V1				Date d'application : 03/04/2023			

IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 150/12,5 ; 300/12,5 et 300/25 mg (<i>Coaprovel</i>)	COAPROVEL	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antagonistes de l'angiotensine II en associations : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques
IRBESARTAN 75, 150 et 300 mg (<i>Aprovel</i>)	APROVEL	COMPRIME		OUI	A prendre à heure fixe. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude mais écrasement possible si administration immédiate. A mélanger à un aliment (l'enrobage masque l'amertume). Peu hydrosoluble et amer.		Antagonistes de l'angiotensine II non associés
ISONIAZIDE / PYRAZINAMIDE / RIFAMPICINE 50/300/120 mg (<i>Rifater</i>)	RIFATER	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à jeun (≥ 30 min avant les repas). Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antituberculeux
ISONIAZIDE / RIFAMPICINE 150/300 mg (<i>Rifinah</i>)	RIFINAH	COMPRIME		NON	A prendre le matin à jeun (≥ 30 min avant les repas). Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antituberculeux
ISRADIPINE LP 2,5 et 5 mg (<i>Icaz LP</i>)	ICAZ LP	GELULE LP		NON	A prendre le matin. DB Pharma 21-02-2022 : pas d'informations complémentaires au RCP		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
ITRACONAZOLE 100 mg (<i>Sporanox</i>)	SPORANOX	GELULE		NON	A prendre en fin de repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable	Antimycosiques à usage systémique : dérivés triazolés
IVABRADINE 5 et 7,5 mg (<i>Procoralan</i>)	PROCORALAN	COMPRIME		OUI	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Arrow 15-03-2022 : l'ensemble des sources bibliographiques rapportent un écrasement possible.		Autres médicaments pour le cœur
IVERMECTINE 3 mg (<i>Stromectol</i>)	STROMECTOL	COMPRIME		OUI	A prendre à jeun (≥ 2h avant ou après les repas).		Antinématodes : Avermectines
JOSAMYCINE 500 mg (<i>Josacine</i>)	JOSACINE	COMPRIME		NON	<u>Astellas Pharma 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Comprimés dispersibles, granulés pour suspension buvable	Macrolides, lincosamides et streptogramines : macrolides
KETOPROFENE 25, 100 et 150 mg (<i>Ketum, Ketesse, Toprec, Profenid, Profemigr, etc.</i>)	KETUM	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.	Suppositoires	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
KETOPROFENE 50 mg (<i>Profenid</i>)	PROFENID	GELULE		NON	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.	Suppositoires	Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
KETOPROFENE LP 100 et 200 mg (<i>Bi profenid</i>) HAD-RP-DOC12-V1	BIPROFENID	COMPRIME LP		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.		Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique

KETOPROFENE LP 200 mg (Profenid LP)	PROFENID LP	GELULE LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas ou une collation pour améliorer la tolérance digestive.	⚠ Non LP ⚠ Suppositoires	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
KETOTIFENE 1 mg (Zaditen)	ZADITEN	GELULE		NON	A prendre de préférence le soir pendant les repas. Alfasigma 08-04-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	Solution buvable	Antihistaminiques à usage systémique
KETOTIFENE LP 2 mg (Zaditen LP)	ZADITEN LP	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence le soir pendant les repas.	⚠ Non LP ⚠ Solution buvable	Antihistaminiques à usage systémique
LABETALOL 200 mg (Trandate)	TRANDATE	COMPRIME		NON	A prendre de préférence en fin de repas. ASPEN Pharma 04-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude interne.		Bêtabloquants
LAMIVUDINE / ZIDOVUDINE 150/300 mg (Combivir)	COMBIVIR	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé et mélangé à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide. Administration immédiate. A prendre de préférence à jeun.	Solutions buvables	Antiviraux pour le traitement des infections au VIH en association
LAMIVUDINE 100, 150 et 300 mg (Eпивir, Zeffix)	EPIVIR ZEFFIX	COMPRIME		OUI	Peut être écrasé et mélangé à une petite quantité de nourriture semi-solide ou de liquide. Administration immédiate.	Solution buvable	Antiviraux à action directe. Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique
LANSOPRAZOLE 15 et 30 mg (Ogast)	OGAST	GELULE GR		OUI	Peut être ouvert et vidé dans un peu d'eau, de jus de pomme ou de tomate, ou saupoudrés dans un peu de nourriture semi-liquide (yaourt, compote). Administration immédiate. A prendre de préférence 30 min avant un repas. Ne pas écraser les granulés	Comprimés orodispersibles	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : Inhibiteurs de la pompe à protons
LEDIPASVIR / SOFOSBUVIR 90/400 mg (Harvoni)	HARVONI	COMPRIME		NON	Ne pas écraser car goût très amer. Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude et goût très amer si broyé.		Antiviraux pour le traitement des infections au VHC
LEFLUNOMIDE 10, 20 et 100 mg (Arava)	ARAVA	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Immunosuppresseurs sélectifs
LENALIDOMIDE 2,5 ; 5 ; 7,5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 mg (Revlimid)	REVLIMID	GELULE		NON	PA cytotoxique et tératogène. A prendre à heure fixe.		Immunosuppresseurs
LERCANIDIPINE 10 et 20 mg (Lercan, Zanidip)	LERCAN ZANIDIP	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le matin à jeun (≥ 15 min avant les repas). Eviter le jus de pamplemousse. Bouchara-Recordati 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine

LETROZOLE 2,5 mg (Femara)	FEMARA	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe. Novartis 10-08-2020 : cf. RCP. Très peu hydrosoluble.		Antihormones et apparentés : Inhibiteurs de l'aromatase
LEVETIRACETAM 250, 500, 750 et 1000 mg (Keppra)	KEPPRA	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à heure fixe. Goût amer. UCB 05-01-2021 : écrasement possible mais très amer. Privilégier solution buvable.	Solution buvable, granulés	Antiépileptiques
LEVOCETIRIZINE 5 mg (Xyzall)	XYZALL	COMPRIME		NON	UCB Pharma 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût amer.		Antihistaminiques à usage systémique Dérivés de la pipérazine
LEVODOPA / BENSERAZIDE 50/12,5 ; 100/25 et 200/50 mg (Modopar)	MODOPAR	GELULE		NON	A prendre ≥ 30 min avant les repas ou ≥ 2h après.	Comprimés dispersibles	Dopaminergiques
LEVODOPA / BENSERAZIDE LP 100/25 mg (Modopar LP)	MODOPAR LP	GELULE LP		NON	A prendre ≥ 30 min avant les repas ou ≥ 2h après.	⚠ Non LP ⚠ Comprimés dispersibles	Dopaminergiques
LEVODOPA / CARBIDOPA / ENTACAPONE tous dosages (Stalevo)	STALEVO	COMPRIME		NON	Notice patient : ne pas écraser. Centre de Spécialités Pharmaceutiques 13-09-2022 : At occasional need STALEVO can be crushed for immediate administration via tube and the tube rinsed thereafter. It is forbidden to dissolve STALEVO in any liquid due to		Dopaminergiques
LEVODOPA / CARBIDOPA 100/10 et 250/25 mg (Sinemet)	SINEMET	COMPRIME		NON	A prendre en fin de repas, ou avec un peu de nourriture.	Gel intestinal (pour stades avancés)	Dopaminergiques
LEVODOPA / CARBIDOPA LP 100/25 et 200/50 mg (Sinemet LP)	SINEMET LP	COMPRIME LP		NON	A prendre en début de repas, ou avec un peu de nourriture.	⚠ Non LP ⚠ Gel intestinal (pour stades avancés)	Dopaminergiques
LEVOFLOXACINE 500 mg (Tavanic)	TAVANIC	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à distance (≥ 2h) des sels de fer, d'antiacides et de sucralfate qui peuvent diminuer l'absorption. Sanofi 14-08-2020 : aucune étude donc écrasement déconseillé. L'enrobage masque le goût. Photosensible.		Quinolones antibactériennes
LEVOMEPRIMAZINE 25 et 100 mg (Nozinan)	NOZINAN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre le soir ou à répartir en 3 prises au moment des repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable en gouttes	Antipsychotiques : Phénothiazines à chaîne latérale aliphatique
LEVOTHYROXINE 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 et 200 µg (L-Thyroxin)	L-THYROXIN	COMPRIME SECABLE		NON	Peut être dissout sans l'écraser dans 10-15 mL d'eau jusqu'à obtenir une suspension, à administrer immédiatement avec un peu d'eau supplémentaire. A prendre le matin à jeun ≥ 30 min avant les repas.	Solution buvable en gouttes	Hormones thyroïdiennes

LEVOTHYROXINE 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 137, 150, 175 et 200 µg (Levothyrox)	LEVOTHYROX	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre le matin à jeun. Merck 05-08-2020 : écrasement possible si administration immédiate (pas d'étude de stabilité)	Solution buvable en gouttes	Hormones thyroïdiennes
LINEZOLIDE 600 mg (Zyvoxid)	ZYVOXID	COMPRIME	En attente (Pfizer)	?	<i>Ecrasable selon HUG 07/2020</i>	Granulés pour suspension buvable	Autres antibactériens
LIOTHYRONINE 0,025 mg (Cynomel)	CYNOMEL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre le matin à jeun. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Hormones thyroïdiennes
LISINOPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Zestoretic)	ZESTORECTIC	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre de préférence à heure fixe. AstraZeneca 02-10-2020 : pas d'étude, peut être écrasé et mis en suspension mais le comprimé est très difficile à écraser.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations
LISINOPRIL 5 et 20 mg (Zestril)	ZESTRIL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		oui	A prendre à heure fixe. AstraZeneca 02-10-2020 : pas d'étude. Peut être écrasé et mis en suspension, à administrer dans un délai ≤ 2h. Très difficile à écraser et très peu hydrosoluble.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
LITHIUM 250 mg (Teralithe)	TERALITHE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude donc écrasement déconseillé, mais possible en cas de nécessité.		Antipsychotiques : Lithium
LITHIUM LP 400 mg (Teralithe LP)	TERALITHE LP	COMPRIME SECABLE LP		NON	⚠ Non LP ⚠ Lithium 250 mg écrasable. A prendre le soir vers 20h pendant les repas.		Antipsychotiques
LOPERAMIDE 2 mg (Imodium, Diaretyl)	IMODIUM	GELULE		NON	<u>Janssen 09-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Comprimés orodispersibles, solution buvable	Antipropulsivants
LOPINAVIR / RITONAVIR 100/25 et 200/50 mg (Kaletra)	KALETRA	COMPRIME		NON	Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable	Antiviraux à action directe
LOPRAZOLAM 1 mg (Havlane)	HAVLANE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant le coucher. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Hypnotiques et sédatifs : dérivés des benzodiazépines
LORATADINE 10 mg (Clarityne)	CLARITYNE	COMPRIME		NON	<u>Bayer 19-08-2020</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Antihistaminiques à usage systémique
LORAZEPAM 1 et 2,5 mg (Temesta)	TEMESTA	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Neuraxpharm 22-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Anxiolytiques : Dérivés des benzodiazépines

LORMETAZEPAM 1 et 2 mg (<i>Noctamide</i>)	NOCTAMIDE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant le coucher. <u>Arrow 15-03-2022</u> : écrasement déconseillé, mais les études rapportent un écrasement possible.		Hypnotiques et sédatifs : dérivés des benzodiazépines
LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/12,5 ; 100/12,5 et 100/25 mg (<i>Hyzaar, Fortzaar</i>)	HYZAAR FORTZAAR	COMPRIME		NON	<u>Organon 30-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. A prendre à heure fixe.		Antagonistes de l'angiotensine II en associations
LOSARTAN 50 et 100 mg (<i>Cozaar</i>)	COZAAR	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. MSD 18-09-2020 : écrasement possible si administration immédiate. Le pelliculage masque le goût amer		Antagonistes de l'angiotensine II non associés
LOXAPINE 25, 50 et 100 mg (<i>Loxapac</i>)	LOXAPAC	COMPRIME		NON	A prendre en une seule prise le soir ou à répartir au cours de la journée. Laboratoires Eisai 11-03-2022 : ne pas écraser les comprimés	Solution buvable	Antipsychotiques : Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines
MAGNESIUM / PYRIDOXINE 48/5 mg (<i>Magne B6</i>)	MAGNE B6	COMPRIME		NON		Solution buvable (Spasmag)	Autres compléments minéraux : Magnésium
MAGNESIUM 100 mg (<i>Mag 2</i>)	MAG 2	COMPRIME		NON	<u>Cooper 22-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable, poudre pour solution buvable	Autres compléments minéraux : Magnésium
MANIDIPINE 10 et 20 mg (<i>Iperfen</i>)	IPERTEN	COMPRIME		NON	A prendre le matin après le petit-déjeuner. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
MAPROTILINE 25 et 75 mg (<i>Ludiomil</i>)	LUDIOMIL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE	En attente (Centre de Spécialités Pharmaceutiques)	?			Antidépresseurs Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines
MARAVIROC 25, 75, 150 et 300 mg (<i>Celsentri</i>)	CESENTRI	COMPRIME	En attente (VIIV Healthcare)	?	Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable	Antiviraux à action directe
MEBEVERINE 100 et 200 mg (<i>Duspatalin</i>)	DUSPATALIN	GELULE		NON	A prendre avant les repas. La gélule assure une libération prolongée.		Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro- intestinaux : Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires
MEBEVERINE 200 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	A prendre avant les repas. Zentiva 17-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro- intestinaux : Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines
MEFLOQUINE 250 mg (<i>Lariam</i>)	LARIAM	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé et dissout dans l'eau pour administration immédiate. Goût amer. Eviter le jus de pamplemousse.		Antipaludéens : alcaloïdes de la quinine

MEGESTROL 160 mg <i>(Megace)</i>	MEGACE	COMPRIME		NON	PA cytotoxique.		Hormones et apparentés : progestatifs
MELOXICAM 7,5 et 15 mg <i>(Mobic)</i>	MOBIC	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas.		Anti-inflammatoires et anti- rhumatismaux non stéroïdiens : Oxicams
MELPHALAN 2 mg <i>(Alkeran)</i>	ALKERAN	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. A prendre de préférence 15-30 min avant les repas pour une absorption optimale.		Alkylants : analogues des moutardes azotées
MEMANTINE 10 et 20 mg <i>(Ebixa)</i>	EBIXA	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre à heure fixe.	Solution buvable	Médicaments contre la démence
MEQUITAZINE 5 et 10 mg <i>(Primalan)</i>	PRIMALAN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir (effet sédatif).		Antihistaminiques à usage systémique :Dérivés de la phénothiazine
MERCAPTOPURINE 50 mg <i>(Purinethol)</i>	PURINETHOL	COMPRIME SECABLE		NON	PA cytotoxique. A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 3h après l'ingestion d'aliments ou de lait.	Suspension buvable	Antimétabolites Analogue de la purine
MESALAZINE 250, 400, 500, 800, 1000 et 1600 mg <i>(Rowasa, Fivasa, Pentasa)</i>	ROWASA FIVASA PENTASA	COMPRIME GR		NON	A prendre pendant les repas en cas de problèmes gastriques. Les suppositoires ou formes rectales n'ont pas forcément les mêmes indications que les formes orales.	Granulés, suppositoires (selon indication)	Anti-inflammatoires intestinaux :Acide aminosalicylique et dérivés
MESNA 400 et 600 mg <i>(Uromitexan)</i>	UROMITEXAN	COMPRIME SECABLE		?			Médicaments détoxifiants dans un traitement cytostatique
METFORMINE 500, 700, 850 et 1000 mg <i>(Glucophage, Stagid)</i>	GLUCOPHAGE STAGID	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON		Comprimés dispersibles	Hypoglycémiants autres que les insulines : Biguanides
METHOTREXATE 2,5 mg <i>(Novatrex)</i>	NOVATREX	COMPRIME		NON	PA cytotoxique.		Antimétabolites : Analogues de l'acide folique
METHYLDOPA 250 et 500 mg <i>(Aldomet)</i>	ALDOMET	COMPRIME		OUI			Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central : Méthylodopa
METHYLPHENIDATE 10 mg <i>(Ritaline)</i>	RITALINE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence ≥ 4h avant le coucher pour éviter les troubles d'endormissement.		Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques : Sympathomimétiques d'action centrale
METHYLPHENIDATE LP 10, 20, 30 et 40 mg <i>(Medikinet LM, Ritaline LP)</i>	MEDIKINET LM RITALINE LP	GELULE LP		OUI Date d'application : 03/04/2023	A prendre le matin. Peut être dispersé dans de la nourriture semi-solide froide (compote, yaourt) et avalé, suivi par la prise d'une boisson. Administration immédiate. Ne pas écraser les granulés		Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques : Sympathomimétiques d'action centrale

METHYLPHENIDATE LP 18, 36 et 54 mg <i>(Concerta LP)</i>	CONCERTA LP	COMPRIME LP		NON	A prendre le matin.	Gélules LP ouvrables	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques : Sympathomimétiques d'action centrale
METHYLPREDNISOLONE 4, 16 et 100 mg (<i>Medrol</i>)	MEDROL	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.	⚠ Adaptation posologique ⚠ Prednisolone orodispersible	Corticoïdes à usage systémique non associés : Glucocorticoïdes
METOCLOPRAMIDE 10 mg (<i>Primperan</i>)	PRIMPERAN	COMPRIME SECABLE		NON		Poudre pour solution buvable, suppositoires sécables	Propulsifs
METOCLOPRAMIDE LP 15 mg (<i>Prokinyl LP</i>)	PROKINYL LP	GELULE LP		NON		⚠ Non LP ⚠ Poudre pour solution buvable, suppositoires sécables	Propulsifs
METOPIMAZINE 15 mg <i>(Vogalene)</i>	VOGALENE	GELULE		NON	A prendre de préférence 15 min avant les repas.	Lyophilisat oral, solution buvable, suppositoires	Antémétiques et antinauséux
METOPROLOL / FELODIPINE LP 47,5/5 mg <i>(Logimax LP)</i>	LOGIMAX LP	COMPRIME LP		NON	A prendre le matin à jeun ou après un repas léger.		Bêta-bloquants et inhibiteurs du canal de calcium
METOPROLOL 50 et 100 mg (<i>Lopressor, Seloken</i>)	LOPRESSOR SELOKEN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant ou en fin de repas.		Bêta-bloquants sélectifs
METOPROLOL LP 23,75 ; 95, 190 et 200 mg <i>(Selokoz LP, Lopressor LP)</i>	SELOKOZ LP LOPRESSOR LP	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant ou en fin de repas, de façon constante.		Bêta-bloquants sélectifs
METRONIDAZOLE / SPIRAMYCINE 125 mg/0,75 MUI et 250 mg/1,5 MUI (<i>Rodogyl, Birodogyl, Bi missilor</i>)	RODOGYL BIRODOGYL BIMISILOR	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.		Antibactériens en association
METRONIDAZOLE 250 et 500 mg (<i>Flagyl</i>)	FLAGYL	COMPRIME		NON		Suspension buvable	Médicaments contre l'amibiase et autres protozooses : Dérivés nitro-imidazolés
MIANSERINE 10, 30 et 60 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON			Antidépresseurs

MIDODRINE 2,5 mg (Gutron)	GUTRON	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le matin et au plus tard 4h avant le coucher.	Solution buvable en gouttes (AAC)	Cardiotoniques sauf les glycosides cardiotoniques. Adrénergiques et dopaminergiques
MIFEPRISTONE 200 et 600 mg (Mifegyne)	MIFEGYNE	COMPRIME		OUI	Ne pas prendre avec du jus de pamplemousse. Nordic pharma 14-02-2022 : pas d'étude mais écrasement possible. Mauvais goût, très peu soluble dans l'eau, soluble en milieu acide. Peut être mélangé à un yaourt ou une compote.		Autres hormones sexuelles et modulateurs de la fonction génitale. Antiprogestatifs
MILNACIPRAN 25 et 50 mg (Ixel)	IXEL	GELULE		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Arrow 15-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude + goût amer.		Antidépresseurs
MINOCYCLINE 100 mg (Mynocine)	MYNOCINE	GELULE		NON	A prendre pendant les repas. Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données		Tétracyclines
MIRTAZAPINE 15 mg (Norset)	NORSET	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir.	Comprimés orodispersibles	Antidépresseurs
MISOPROSTOL 25, 200 et 400 µg (Angusta, Gymiso, Misoone)	ANGUSTA GYMISO MISOONE	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON			Médicaments pour l'ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : Prostaglandines
MITOTANE 500 mg (Lysodren)	LYSODREN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant des repas riches en graisses. PA cytotoxique : à manipuler avec des gants jetables.		Autres antinéoplasiques
MOCLOBEMIDE 150 mg (Moclamine)	MOCLAMINE	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre en fin de repas, en évitant les prises trop tardives. Biocodex 25-02-2022 : écrasable si besoin mais goût amer. Peut être mélangé à une boisson ou un aliment, mais éviter ceux trop acides par précaution.		Antidépresseurs : Inhibiteurs de la monamine oxydase de type A (IMAO-A)
MODAFINIL 100 mg (Modiodal)	MODIODAL	COMPRIME		NON	<u>Teva 01-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques : Sympathomimétiques d'action centrale
MOLSIDOMINE 2 et 4 mg (Corvasal)	CORVASAL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques
MONTELUKAST 10 mg (Singulair)	SINGULAIR	COMPRIME		OUI	A prendre le soir. MSD 19-09-2020 : Le pelliculage masque le goût amer. Thermosensible et instable dans l'eau. Administration immédiate si écrasement.	Comprimés à croquer, granulés	Autres médicaments systémiques pour les syndromes obstructifs des voies respiratoires : Antagonistes des récepteurs des leucotriènes

MORPHINE SULFATE 10 et 20 mg (<i>Sevredol</i>)	SEVREDOL	COMPRIME SECABLE		NON	Risque d'effets indésirables graves avec les comprimés écrasés. Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable, gélules ouvrables	Opioïdes : alcaloïdes naturels de l'opium
MORPHINE SULFATE 5, 10, 20 et 30 mg (<i>Actiskenan</i>)	ACTISKENAN	GELULE		OUI	Peut être dispersé dans un aliment semi-solide (compote, yaourt...). Administration immédiate. Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Ne pas écraser les granulés	Solution buvable	Opioïdes : alcaloïdes naturels de l'opium
MORPHINE SULFATE LP 10, 30, 60, 100 et 200 mg (<i>Moscontin LP</i>)	MOSCONTIN LP	COMPRIME LP		NON	Risque d'effets indésirables graves avec les comprimés écrasés.	Gélules LP ouvrables	Opioïdes : alcaloïdes naturels de l'opium
MORPHINE SULFATE LP 10, 30, 60, 100 et 200 mg (<i>Skenan LP</i>)	SKENAN LP	GELULE LP		OUI	Peut être dispersé dans un aliment semi-solide (compote, yaourt...). Administration immédiate. Ne pas écraser les granulés	Pas d'équivalent LP	Opioïdes : alcaloïdes naturels de l'opium
MOXIFLOXACINE 400 mg (<i>IziloX</i>)	IZILOX	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Bayer 21-02-2022 : écrasement possible mais goût amer, peut être mélangé à des aliments semi-liquides		Quinolones antibactériennes : fluoroquinolones
MOXONIDINE 0,2 et 0,4 mg (<i>Physiotens</i>)	PHYSIOTENS	COMPRIME		?	A prendre de préférence à heure fixe.		Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central : Agonistes des récepteurs de l'imidazoline
MYCOPHENOLATE 180 et 360 mg (<i>Myfortic</i>)	MYFORTIC	COMPRIME GR		NON	PA tératogène. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP		Immunosuppresseurs sélectifs
MYCOPHENOLATE 250 mg (<i>Cellcept</i>)	CELLCEPT	GELULE		NON	PA tératogène.		Immunosuppresseurs sélectifs
MYCOPHENOLATE 500 mg (<i>Cellcept</i>)	CELLCEPT	COMPRIME		NON	PA tératogène.		Immunosuppresseurs sélectifs
NABUMETONE 500 mg (<i>Nabucox</i>)	NABUCOX	COMPRIME		NON		Comprimés dispersibles	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens
NADOLOL 80 mg (<i>Corgard</i>)	CORGARD	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le matin. Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP		Bêta-bloquants non sélectifs
NAFTIDROFURYL 200 mg (<i>Naftilux</i>)	NAFTILUX	GELULE		NON	A prendre pendant les repas. PA irritant. Therabel 25-02-2022 : cf. RCP		Vasodilatateurs périphériques
NALTREXONE 50 mg (<i>Revia</i>) HAD-RP-DOC12-V1	REVIA	COMPRIME SECABLE		NON Date d'application : 03/04/2023	<u>Accord Healthcare</u> 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Médicaments des troubles de l'addiction : médicaments utilisés en cas de dépendance à l'alcool

NAPROXENE 220, 250, 275, 500, 550, 750 et 1000 mg (<i>Antalnox, Naprosyne, Alevetabs, Apranax</i>)	ANTALNOX NAPROSYNE ALEVETABS APRANAX	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas. Pierre Fabre 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide propionique
NARATRIPTAN 2,5 mg (<i>Naramig</i>)	NARAMIG	COMPRIME		NON	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible. GSK 15-02-2022 : cf RCP		Antimigraineux : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1
NEBIVOLOL 5 mg (<i>Temerit</i>)	TEMERIT	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Menarini 14-02-2022</u> : non-écrasable car pas d'étude.		Bêta-bloquants sélectifs
NEVIRAPINE 200 mg (<i>Viramune</i>)	VIRAMUNE	COMPRIME		NON	<u>Boehringer Ingelheim 24-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Suspension buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique
NEVIRAPINE LP 100 et 400 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME LP		NON		⚠ Non LP ⚠ Suspension buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique
NICARDIPINE 20 mg (<i>Loxen</i>)	LOXEN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
NICARDIPINE LP 50 mg (<i>Loxen LP</i>)	LOXEN LP	GELULE LP		NON	A prendre avant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
NICORANDIL 10 et 20 mg (<i>Ikorel</i>)	IKOREL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	Administration immédiate. Sanofi 14-08-2020 : déconseillé mais possible si administration immédiate. Sensible à l'humidité. Ne pas dissoudre dans l'eau		Vasodilatateurs utilisés dans les maladies cardiaques
NICOTINAMIDE 500 mg (<i>Nicobion</i>)	NICOBION	COMPRIME		NON	<u>Teofarma 08-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible.		Autres préparations à base de vitamines seules
NIFEDIPINE LP 20 et 30 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME LP		NON	Eviter le jus de pamplemousse.		
NILOTINIB 50, 150 et 200 mg (<i>Tasigna</i>)	TASIGNA	GELULE		OUI	A prendre ≥ 2h après et ≥ 1h avant les repas. La gélule peut être vidée dans une cuillère à café de compote de pomme uniquement, pour administration immédiate. Eviter le jus de pamplemousse. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP		Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase

NILUTAMIDE 50 et 150 (Anandron)	ANANDRON	COMPRIME		NON	<u>Cheplapharm 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Antihormones et apparentés :Anti-androgènes
NIMODIPINE 30 mg (Nimotop)	NIMOTOP	COMPRIME		NON	Eviter le jus de pamplemousse. Bayer 21-02-2022 : écrasement déconseillé car photosensible.		
NINTEDANIB 100 et 150 mg (Ofev)	OFEV	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre à heure fixe pendant les repas. Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP		Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
NITRAZEPAM 5 mg (Mogadon)	MOGADON	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre avant le coucher.		Hypnotiques et sédatifs : dérivés des benzodiazépines
NITRENDIPINE 10 et 20 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	A prendre en fin de repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques sélectifs à effets vasculaires : Dérivés de la dihydropyridine
NITROFURANTOINE 50 mg (Furadantine)	FURADANTINE	GELULE		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Teva 01-03- 2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	Solution buvable (AAC)	Autres antibactériens : Dérivés du nitrofurane
NOMEGESTROL 5 mg (Lutenyl)	LUTENYL	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Theramex 17-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Progestatifs Dérivés pregnadiène
NORETHANDROLONE 10 mg (Nilevar)	NILEVAR	COMPRIME SECABLE		NON			Stéroïdes anabolisants :Dérivés de l'androstane
NORFLOXACINE 400 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	Ne pas prendre avec un produit laitier. Arrow 15-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Quinolones antibactériennes : fluoroquinolones
OFLOXACINE 200 mg (Monoflocet, Oflocet)	MONOFLOCET OFLOCET	COMPRIME SECABLE		NON	Ne pas prendre de fer, d'antiacides ou de sucralfate 2h après la prise. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude donc écrasement déconseillé. Le pelliculage masque le goût amer. Sensible à la lumière et l'humidité.		Quinolones antibactériennes : fluoroquinolones
OLANZAPINE 5, 7,5 et 10 mg (Zyprexa)	ZYPREXA	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. PA irritant. Lilly 06-08-2020 : écrasement déconseillé car comprimé sensible à la lumière et à l'oxydation, et risque de majoration des EI	Comprimés orodispersibles	Antipsychotiques : Diazépines, oxazépines, thiazépines et oxépines
OLAPARIB 100, 150 mg (Lynparza)	LYNPARZA	COMPRIME		NON	Eviter le jus de pamplemousse. AstraZeneca 13-05-2022 : cf. RCP		Autres antinéoplasiques :linhibiteurs de poly (ADP- RIBOSE) polymérase (PARP)
OLMESARTAN 10, 20 et 40 mg (Alteis, Olmetec) HAD-RP-DOC12-V1	ALTEIS OLMETEC	COMPRIME		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre à heure fixe.		Antagonistes de l'angiotensine II non associés

OMEPRAZOLE 10 et 20 mg (<i>Mopral, Zoltum</i>)	MOPRAL ZOLTUM	GELULE LR		OUI	Les gélules peuvent être vidées dans de l'eau plate, un jus ou une compote. Administration immédiate (< 30 min). 'Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP. Ne pas écraser les granulés	Comprimés GR	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : Inhibiteurs de la pompe à protons
ONDANSETRON 4 et 8 mg (<i>Zophren</i>)	ZOPHREN	COMPRIME		NON	<u>Novartis 16-03-2022</u> : cf. RCP	Comprimés orodispersibles, sirop, suppositoire	Antémétiques et antinauséeux : Antagonistes de la sérotonine (5-HT3)
ORNIDAZOLE 500 (<i>Tiberal</i>)	TIBERAL	COMPRIME		NON	<u>Serb 22-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude + photosensible.		Autres antibactériens Dérivés de l'imidazole
OSELTAMIVIR 30, 45 et 75 mg (<i>Tamiflu, Ebilfumin</i>)	TAMIFLU EBILFUMIN	GELULE		OUI	A mélanger à un liquide sucré (eau sucrée, chocolat liquide, sirop, coulis) pour masquer le goût. Administration immédiate.	Poudre pour suspension buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la neuraminidase
OXAZEPAM 10 et 50 mg (<i>Seresta</i>)	SERESTA	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	<u>Neuraxpharm 22-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Anxiolytiques : Dérivés des benzodiazépines
OXCARBAZEPINE 150, 300 et 600 mg (<i>Trileptal</i>)	TRILEPTAL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à heure fixe sauf mention contraire. Peut être cassé en deux pour être avalé plus facilement. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP	Suspension buvable	Antiépileptiques : Dérivés du carboxamide
OXETORONE 60 mg (<i>Nocertone</i>)	NOCERTONE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence avant les repas du soir et au coucher. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antimigraigneux
OXYBUTYNINE 5 mg (<i>Ditropan</i>)	DITROPAN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à jeun, ou si douleurs gastriques pendant les repas ou avec du lait. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Mauvais goût.	Sirop (AAC)	Antispasmodiques urinaires
OXYCODONE 5, 10 et 20 mg (<i>Oxynorm</i>)	OXYNORM	GELULE		NON	Eviter le jus de pamplemousse. Mundipharma 03-08-2020 : la gélule n'est qu'un vecteur mais ouverture déconseillée car pas d'étude	Comprimés orodispersibles, solution buvable	Alcaloïdes naturels de l'opium : opioïdes
OXYCODONE LP 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, 80 et 120 mg (<i>Oxycontin LP</i>)	OXYCONTIN LP	COMPRIME LP		NON	Risque de surdosage si écrasement. Eviter le jus de pamplemousse. 'Mundipharma 03-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude	⚠ Non LP ⚠ Comprimés orodispersibles, solution buvable	Alcaloïdes naturels de l'opium : opioïdes
PANCREATINE 10, 12,5 ; 25 et 40 kU (<i>Creon, Eurobiol</i>)	CREON EUROBIOL	GELULE LR		OUI	Peut être vidé dans un aliment acide semi-solide (compote, yaourt) ou liquide (jus de fruit, lait). Administration immédiate. Ne pas croquer ni garder en bouche le mélange. Ne pas écraser les granulés	Granulés GR	Enzymes

PANTOPRAZOLE 20 et 40 mg (<i>Eupantol, Inipomp, Ipraalox</i>)	EUPANTOL INIPOMP	COMPRIME GR		NON	A prendre 1h avant les repas.		Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : inhibiteurs de la pompe à protons
PARACETAMOL / CODEINE 300/25, 400/20, 400/25, 500/30 et 600/50 mg (<i>Codoliprane, Dafalgan codeine, Klipal codeine, Lindilane</i>)	CODOLIPRANE DAFALGAN CODEINE KLIPAL CODEINE LINDILANE	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc écrasement déconseillé.	Comprimés effervescents	Autres analgésiques et antipyrétiques : anilides
PARACETAMOL / CODEINE 500/30 mg (<i>Codoliprane</i>)	CODOLIPRANE	GELULE		NON		Comprimés effervescents	Alcaloïdes naturels de l'opium : opioïdes
PARACETAMOL / OPIUM ± CAFEINE 300/10/30 et 500/25 mg (<i>Lamaline, Izalgi</i>)	LAMALINE IZALGI	GELULE		NON		Suppositoires	Autres analgésiques et antipyrétiques : anilides
PARACETAMOL / PSEUDOEPHEDRINE / DIPHENHYDRAMINE 500/60/25 mg (<i>Actifed rhume jour & nuit</i>) PARACETAMOL / PSEUDOEPHEDRINE / TRIPROLIDINE 500/60/2.5 mg (<i>Actifed</i>)	ACTIFED RHUME	COMPRIME		NON			Décongestionnants nasaux à usage systémique : Sympathomimétiques
PARACETAMOL / TRAMADOL 37,5/325 mg (<i>Ixprim, Zaldiar</i>)	IXPRIM ZALDIAR	COMPRIME		NON		Comprimés effervescents	Opioides
PARACETAMOL 500 et 1000 mg (<i>Dafalgan, Doliprane</i>)	DAFALGAN DOLIPRANE	GELULE		NON	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc ouverture déconseillée. Très amer.	Comprimés effervescents, suppositoires	Autres analgésiques et antipyrétiques : anilides
PARACETAMOL 500 et 1000 mg (<i>Dafalgan, Doliprane</i>)	DAFALGAN DOLIPRANE	COMPRIME		NON	<u>UPSA 17-02-2022</u> : pas d'opposition à l'écrasement mais pas d'étude et goût très amer, donc déconseillé.	Comprimés effervescents, suppositoires	Autres analgésiques et antipyrétiques : anilides
PAROXETINE 20 mg (<i>Deroxat</i>)	DEROXAT	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre le matin pendant les repas pour réduire le risque de nausées. 'GSK 02-10-2020 : écrasement déconseillé car pas de données. Mauvais goût et photosensible.	Suspension buvable	Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
PAZOPANIB 200 et 400 mg (<i>Votrient</i>)	VOTRIENT	COMPRIME		NON	A prendre ≥ 1h avant ou ≥ 2h après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable (AAC)	Autres antinéoplasiques Inhibiteurs de protéine kinase
PENICILLAMINE 300 mg (<i>Trolovol</i>)	TROVOLOL	COMPRIME		NON	A prendre 1h avant les repas chez l'enfant dans certaines indications (cf. RCP). Laboratoire XO 14-02-2022 : écrasement déconseillé en l'absence de données. Comprimé non-sécable malgré la barrette de cassure.		Antirhumatismaux spécifiques : Pénicillamine et analogues

PENTOXIFYLLINE LP 400 mg (<i>génériques</i>)	GENERIQUES	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas.		Vasodilatateurs périphériques : dérivés de la purine
PERAMPANEL 2, 4, 6, 8, 10 et 12 mg (<i>Fycompa</i>)	FYCOMPA	COMPRIME		NON	A prendre au coucher.	Suspension buvable	Antiépileptiques
PERINDOPRIL / INDAPAMIDE 2,5/0,625 ; 4/1,25 ; 5/1,25 ; 8/2,5 et 10/2,5 (<i>Preterax, Bipreterax, Preterval</i>)	PRETERAX BIPRETERAX PRETERVAL	COMPRIME		NON	Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude. A prendre avant les repas, de préférence le matin.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques
PERINDOPRIL 2,5 ; 5 et 10 mg (<i>Coversyl</i>)	COVERSYL	COMPRIME		NON	A prendre avant les repas, de préférence le matin. Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
PHENOBARBITAL / CAFFEINE 15/3,75 ; 50/12,5 ; 100/25 et 150/37,5 mg (<i>Alepsal</i>)	ALEPSAL	COMPRIME		OUI	A prendre le soir au coucher. Peut être écrasé et mélangé à l'alimentation.		Antiépileptiques : Barbituriques et dérivés
PHENOBARBITAL 10, 50 et 100 mg (<i>Gardenal</i>)	GARDENAL	COMPRIME		OUI	A prendre le soir au coucher. Peut être écrasé et mélangé à l'alimentation.		Antiépileptiques : Barbituriques et dérivés
PHENOXYMETHYLPENICILLINE 1 M UI (<i>Oracilline</i>)	ORACILLINE	COMPRIME SECABLE		OUI	<u>UCB Pharma 24-02-2022</u> : écrasement et mélange possible dans un liquide sucré ou de la compote. Administration immédiate.	Suspension buvable	Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines : Pénicillines sensibles aux bêta-lactamases
PHENYLBUTYRATE 500 mg (<i>Ammonaps</i>)	AMMONAPS	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Immedica 16-02-2022 : non écrasable car pas de données. Mauvais goût. Privilégier les alternatives.	Granulés, liquide oral	Autres produits pour les voies digestives et le métabolisme
PHENYTOÏNE 100 mg (<i>Di-hydan, Diphante</i>)	DIHYDAN	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre de préférence 1h avant les repas avec ½ verre d'eau, ou en cas d'irritation gastrique pendant les repas. Les comprimés écrasés peuvent être mélangés à de la nourriture. Médicament à marge thérapeutique étroite	Suspension buvable (AAC)	Antiépileptiques : Hydantoïne et dérivés
PHLOROGLUCINOL / SIMETICONE 80/125 mg (<i>Meteoxane</i>)	METEOXANE	GELULE		NON	A prendre avant les repas ou au moment des douleurs. Alfisigma 08-04-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	Comprimés orodispersibles (Δ Phloroglucinol seul)	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux : Autres médicaments en cas de troubles fonctionnels du côlon

PHLOROGLUCINOL 80 mg (Spasfon)	SPASFON	COMPRIME		NON	<u>Teva 01-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Comprimés orodispersibles, suppositoires	Médicaments contre les désordres fonctionnels gastro-intestinaux
PIMOZIDE 1 et 4 mg (Orap)	ORAP	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre le soir. Eviter le jus de pamplemousse. Eumedica 02-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antipsychotiques : Dérivés de la diphénylbutylpipéridine
PINAVERIUM 50 et 100 mg (Dicetel)	DICETEL	COMPRIME		NON	PA irritant pour l'œsophage. Les comprimés doivent être ingérés sans les croquer, ni les sucer, avec un grand verre d'eau au milieu des repas. Ne pas prendre en étant allongé ou avant le coucher.		Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux : Autres médicaments en cas de troubles fonctionnels du côlon
PINDOLOL 5 et 15 mg (Visken)	VISKEN	COMPRIME		NON	En attente (Centre de Specialites Pharmaceutiques)		Bêta-bloquants
PIPAMPERONE 40 mg (Dipiperon)	DIPIPERON	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence au dîner ou au coucher.	Solution buvable	Antipsychotiques : Dérivés de la butyrophénone
PIRACETAM 400 et 800 mg (Gabacet)	GABACET	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	<u>Arrow 15-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable	Psychostimulants, agents utilisés dans le trouble déficit de l'attention / hyperactivité (TDAH) et nootropiques
PIRETANIDE 6 mg (Eurelix)	EURELIX	GELULE GR	 	OUI	A prendre de préférence après les repas le matin ou en milieu de journée. Ne pas écraser les granulés		Diurétiques de l'anse : Sulfamides non associés
PIRIBEDIL LP 50 mg (Trivastal LP)	TRIVASTAL LP	COMPRIME LP		NON	A prendre en fin de repas.		Dopaminergiques : Agonistes dopaminergiques
PIROXICAM 10 et 20 mg (Feldene)	FELDENE	GELULE		NON	PA irritant. A prendre pendant les repas.	Comprimés effervescents, comprimés dispersibles	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Oxicams
PIROXICAM 20 mg (Brexin, Cycladol)	BREXIN CYCLADOL	COMPRIME SECABLE		NON	PA irritant. A prendre pendant les repas.	Comprimés effervescents, comprimés dispersibles	Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Oxicams
PIVMECILLINAM 200 mg (Selexid)	SELEXID	COMPRIME		OUI	A prendre pendant les repas, en position debout ou assise et ne pas s'allonger ≥ 30 min après la prise pour limiter le risque d'ulcération de l'œsophage. Alloga 21-04-2022 : écrasement possible mais médicament amer		Antibactériens bêta-lactamines et pénicillines : Pénicillines à large spectre

PIZOTIFENE 0,5 mg (Sanmigran)	SANMIGRAN	COMPRIME		OUI	En attente (Centre de Specialites Pharmaceutiques)		Antimigraineux
POMALIDOMIDE 1, 2, 3, 4 mg (Imnovid)	IMNOVID	GELULE		NON	PA cytotoxique et tératogène. A prendre à heure fixe.		Immunosuppresseurs
PONATINIB 15, 30 et 45 mg (Iclusig)	ICLUSIG	COMPRIME		NON			Autres antinéoplasiques : inhibiteurs de protéine kinase
POSACONAZOLE 100 mg (Noxafil)	NOXAFIL	COMPRIME GR		NON	Non-interchangeabilité entre la suspension buvable et les comprimés : suivre leurs recommandations posologiques respectives.	Suspension buvable ⚠ Adaptation posologique ⚠	Antimycosiques à usage systémique : dérivés triazolés
POTASSIUM CHLORURE 600 mg (Diffu K)	DIFFU K	GELULE	 	OUI	<u>UCB Pharma 24-02-2022</u> : gélules ouvrables si besoin, ne pas mâcher les microgranules (risque d'ulcération de l'estomac du fait de la libération de cristaux de chlorure de potassium). Ne pas écraser les granulés	Sirop	Potassium
POTASSIUM CHLORURE LP 600 et 1000 mg (Kaleorid LP)	KALEORID LP	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence en fin de repas.	Sirop	Potassium
PRAMIPEXOLE 0,18 et 0,7 mg (Sifrol)	SIFROL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas. Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : photosensible, cf. RCP		Dopaminergiques : Agonistes dopaminergiques
PRAMIPEXOLE LP 0,26 ; 0,52 ; 1,05 et 2,1 mg (Sifrol LP)	SIFROL LP	COMPRIME LP		NON	A prendre à heure fixe. Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : photosensible, cf. RCP		Dopaminergiques : Agonistes dopaminergiques
PRAVASTATINE 10, 20 et 40 mg (Vasten)	VASTEN	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir. Sanofi 14-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)
PRAZEPAM 10 et 40 mg (Lysanxia)	LYSANXIA	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	<u>Alfasigma 08-04-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.	Solution buvable en gouttes	Anxiolytiques : Dérivés des benzodiazépines
PRAZIQUANTEL 600 mg (Biltricide)	BILTRICIDE	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé ou désagréé et mélangé à un liquide ou un aliment semi-solide. A prendre de préférence pendant ou en fin de repas, le soir en cas de prise unique.		Antitrimatodes : Dérivés de la quinoléine et apparentés

PRAZOSINE LP 2,5 et 5 mg (<i>Alpress LP</i>)	ALPRESS LP	COMPRIME OSMOTIQUE		NON			Antiagrégants agissant en périphérie : Alpha-bloquants
PREDNISONE 1, 5 et 20 mg (<i>Cortancyl</i>)	CORTANCYL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre de préférence au cours des repas. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude mais écrasement possible si administration immédiate. Photosensible.	⚠ Adaptation posologique ⚠ Prednisolone orodispersible	Corticoïdes à usage systémique non associés : Glucocorticoïdes
PREGABALINE 25, 50, 75, 100, 150, 200 et 300 mg (<i>Lyrica</i>)	LYRICA	GELULE		OUI	<u>Pfizer 04-08-2020</u> : ouverture déconseillée, mais une étude prouve la bioeq des gélules ouvertes. Mélange à de l'eau, jus de fruits ou nourriture semi-solide à la discrétion du clinicien.	Solution buvable	Antépileptiques
PRIMIDONE 250 mg (<i>Mysoline</i>)	MYSOLINE	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre à heure fixe.		Antépileptiques : Barbituriques et dérivés
PRISTINAMYCINE 250 et 500 mg (<i>Pyostacine</i>)	PYOSTACINE	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé dans un peu de lait ou un aliment sucré (confiture). A prendre pendant les repas.		Macrolides, lincosamides et streptogramines : Streptogramines
PROBENECIDE 500 mg (<i>Santuril</i>)	SANTURIL	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé et mélangé à un yaourt ou un liquide sucré. A prendre pendant les repas.		Médicaments contre la goutte : Uricosuriques
PROCARBAZINE 50 mg (<i>Natulan</i>)	NATULAN	GELULE		NON	PA cytotoxique. Boire abondamment pendant la prise.		Autres antinéoplasiques : Méthyldiazines
PROGESTERONE 100 et 200 mg (<i>Utrogestan</i>)	UTROGESTAN	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre à distance des repas, de préférence le soir au coucher. Peut être également administré par voie vaginale.		Progestatifs : Dérivés pregnadiène
PROMETHAZINE 25 mg (<i>Phenergan</i>)	PHENERGAN	COMPRIME		NON	A prendre de préférence le soir (effet sédatif). DB Pharma 21-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antihistaminiques à usage systémique : Dérivés de la phénothiazine
PROPafenone 300 mg (<i>Rythmol</i>)	RYTHMOL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre après les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Antiarythmiques de classe I et III : Antiarythmiques, classe Ic
PROPERICIAZINE 10 mg (<i>Neuleptil</i>)	NEULEPTIL	GELULE		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude	Solution buvable en gouttes	Antipsychotiques : Phénothiazines de structure pipéridinique

PROPRANOLOL 40 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Biogaran 19-08-2020</u> : écrasement déconseillé car pas d'études	Solution buvable	Bêta-bloquants
PROPRANOLOL LP 80 et 160 mg (génériques)	GENERIQUES	GELULE LP		NON	A prendre de préférence le matin. Teva 01-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude	⚠ Non LP ⚠ Solution buvable	Bêta-bloquants
PROPYLTHIOURACILE 50 mg (Propylex)	PROPYLEX	COMPRIME		OUI	<u>HAC Pharma 22-02-2022</u> : écrasement possible si besoin, avec administration immédiate et protection appropriée de l'opérateur		Antithyroïdiens Thiouraciles
PYRAZINAMIDE 500 mg (Pirilene)	PIRILENE	COMPRIME SECABLE		OUI	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : Peut être écrasé et mélangé à des liquides ou des aliments sucrés pour masquer l'amertume		Antituberculeux
PYRIDOSTIGMINE 60 mg (Mestinon)	MESTINON	COMPRIME		?	En attente (Viatris)	Sirop (AAC)	Parasympathomimétiques : Anticholinestérasiques
PYRIDOSTIGMINE LP 180 mg (Mestinon LP)	MESTINON LP	COMPRIME LP		NON	A ne pas prendre en position couchée.	⚠ Non LP ⚠ Sirop (AAC)	Parasympathomimétiques : Anticholinestérasiques
PYRIDOXINE / THIAMINE 35/250 et 50/250 mg (Vitamine B1 B6, Princi B)	VITAMINE B1 B6 PRINCI B	COMPRIME		NON			Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12
PYRIDOXINE 250 mg (Becilan)	BECILAN	COMPRIME SECABLE		NON	<u>DB Pharma 21-02-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Autres préparations à base de vitamines seules
PYRIMETHAMINE 50 mg (Malocide)	MALOCIDE	COMPRIME		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antipaludéens Diaminopyrimidines
QUINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 20/12,5 mg (Acuillix)	ACUILIX	COMPRIME SECABLE		NON	En attente (Pfizer)		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine et diurétiques
QUINAPRIL 5 et 20 mg (Acuitel)	ACUITEL	COMPRIME SECABLE		NON	En attente (Pfizer)		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
QUININE / QUINIDINE / CINCHONINE / CINCHONIDINE 120/3,3/0,85/0,85 mg et 480/13,3/3,4/3,4 mg (Quinimax)	QUINIMAX	COMPRIME SECABLE		NON	Eviter le jus de pamplemousse. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude Date d'application : 03/04/2023		Antipaludéens : Alcaloïdes de la quinine

RABEPRAZOLE 10 et 20 mg (<i>Pariet</i>)	PARIET	COMPRIME GR		NON	A prendre le matin avant les repas (uniquement pour favoriser l'observance : ni l'heure de prise ni l'alimentation n'a d'influence sur l'activité du Rabéprazole) Janssen 09-03-2022 : non écrasable car PA instable en milieu acide.		Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : Inhibiteurs de la pompe à protons
RACECADOTRIL 100 mg (<i>Tiorfan, Diarfix, Tiorfast</i>)	TIROFAN DIARFIX TIORFAST	GELULE		OUI	En attente (Bioprojet Pharma)	Poudre orale, suspension buvable	Autres antidiarrhéiques
RACECADOTRIL 175 mg (<i>Tiorfanor</i>)	TIORFANOR	COMPRIME		NON	En attente (Bioprojet Pharma)	Poudre orale, suspension buvable	Autres antidiarrhéiques
RALTEGRAVIR 400 et 600 mg (<i>Isentress</i>)	ISENTRESS	COMPRIME		NON	Non-interchangeabilité entre les comprimés, comprimés à croquer et granulés : suivre leurs recommandations posologiques respectives.	Comprimés à croquer, granulés pour suspension buvable	Antiviraux à action directe
RAMIPRIL / HYDROCHLOROTHIAZIDE 5/12,5 mg (<i>Cotriatec</i>)	COTRIATEC	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe, de préférence le matin. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations
RAMIPRIL 1,25 ; 2, 5 et 10 mg (<i>Triatec</i>)	TRIA TEC	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à heure fixe. Sanofi 14-08-2020 : cf. RCP. Peu hydrosoluble.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations
REPAGLINIDE 0,5 ; 1 et 2 mg (<i>Novonorm</i>)	NOVONORM	COMPRIME		NON	A prendre moins de 30 min avant les repas. Novo Nordisk 01-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Hypoglycémiantes autres que les insulines
RIFABUTINE 150 mg (<i>Ansatispine</i>)	ANSATIPINE	GELULE		NON	<u>Serb 22-03-2022</u> : peut être ouvert et mélangé à de la compote de pommes.		Antituberculeux : Antibiotiques
RIFAMPICINE 300 mg (<i>Rifadine, Rimactan</i>)	RIFADINE RIMACTAN	GELULE		NON	A prendre de préférence ≥ 30 min avant les repas; Sanofi 23-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.	Suspension buvable	Antituberculeux : Antibiotiques
RILMENIDINE 1 mg (<i>Hyperium</i>)	HYPERIUM	COMPRIME		NON	A prendre le matin. Servier 28-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antiadrénergiques agissant sur le système nerveux central : Agonistes des récepteurs de l'imidazoline
RILPIVIRINE 25 mg (<i>Edurant</i>)	EDURANT	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Janssen 09-03-2022 : cf. RCP		Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse non nucléosidique
RILUZOLE 50 mg (<i>Rilutek</i>) HAD-RP-DOC12-V1	RILUTEK	COMPRIME		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre à heure fixe. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Suspension buvable	Autres médicaments du système nerveux

RISPERIDONE 1, 2 et 4 mg (<i>Risperdal</i>)	RISPERDAL	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Janssen 09-09-2020</u> : déconseillé car pas d'étude et risque majoré d'effets indésirables + goût amer.	Comprimés orodispersibles, solution buvable	Antipsychotiques
RITONAVIR 100 mg (<i>Norvir</i>)	NORVIR	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.	Suspension buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de protéase
RIVAROXABAN 10, 15 et 20 mg (<i>Xarelto</i>)	XARELTO	COMPRIME		OUI	Peut être écrasé et mélangé à de l'eau ou de la compote de pommes. Administration immédiate.	Granulés pour suspension buvable (AAP)	Antithrombotiques : Inhibiteurs directs du facteur Xa
RIVASTIGMINE 1,5 ; 3, 4,5 et 6 mg (<i>Exelon</i>)	EXELON	GELULE		NON	A prendre pendant les repas.	Solution buvable, dispositif transdermique	Médicaments contre la démence : Anticholinestérasiqes
RIZATRIPTAN 5 et 10 mg (<i>Maxalt</i>)	MAXALT	COMPRIME		NON	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.	Comprimés orodispersibles	Antimigraineux : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1
ROPINIROLE 0,25 ; 0,5 ; 1, 2 et 5 mg (<i>Requip</i>)	REQUIP	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. GSK 07-10-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible et hydrosoluble.		Dopaminergiques : Agonistes dopaminergiques
ROPINIROLE LP 2, 4 et 8 mg (<i>Requip LP</i>)	REQUIP LP	COMPRIME LP		NON	A prendre à heure fixe. 'GSK 10-07-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible et hydrosoluble.		Dopaminergiques : Agonistes dopaminergiques
ROSUVASTATINE 5, 10 et 20 mg (<i>Crestor</i>)	CRESTOR	COMPRIME		OUI	A prendre de préférence à heure fixe. AstraZeneca 02-10-2020 : pas d'étude mais pas d'opposition à l'écrasement		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)
ROXITHROMYCINE 100 et 150 mg (<i>Rulid</i>)	RULID	COMPRIME		NON	A prendre de préférence avant les repas. Sanofi 14-08-2020 : pas d'étude donc écrasement déconseillé. Raison de l'enrobage indisponible.	Comprimés pour suspension buvable (50 mg)	Macrolides, lincosamides et streptogramines
RUFINAMIDE 100, 200 et 400 mg (<i>Inovelon</i>)	INOVELON	COMPRIME		OUI	Peut être écrasé et administré avec de l'eau. A prendre pendant les repas.	Suspension buvable	Antiépileptiques : Dérivés du carboxamide
RUXOLITINIB 5, 10, 15 et 20 mg (<i>Jakavi</i>)	JAKAVI	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP		Autres antinéoplasiques Inhibiteurs de protéine kinase

SACCHAROMYCES BOULARDII 50 et 200 mg (Ultra-levure)	ULTRALEVURE	GELULE		NON	ATTENTION : Ne pas ouvrir les gélules dans l'environnement d'un patient immunodéprimé ou porteur d'un cathéter veineux (risque de contamination). Biocodex 17-02-2022 : ouvrable si administration immédiate, sauf cas particuliers (cf. RCP). Ne pas dissoudre dans un liquide réfrigéré. Sensible à l'humidité.	Poudre pour suspension buvable	Micro-organismes antidiarrhéiques
SACCHAROMYCES CEREVISIAE / CHARBON ACTIVE (Carbolevure adultes)	CARBOLEVURE	GELULE		NON	A prendre de préférence en dehors des repas. Pierre Fabre 21-02-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude.		Absorbants intestinaux : Préparations à base de charbon activé
SAXAGLIPTINE / METFORMINE 2,5/1000 mg (Komboglyze)	KOMBOGLYZE	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Goût métallique.		Hypoglycémiantes autres que les insulines : Association de médicaments oraux réduisant la glycémie
SAXAGLIPTINE 5 mg (Onglyza)	ONGLYZA	COMPRIME		NON	A prendre de préférence à heure fixe. AstraZeneca 06-04-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Hypoglycémiantes autres que les insulines. Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
SELEGILINE 5 mg (Deprenyl)	DEPRENYL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas.	Dispositif transdermique (AAC)	Dopaminergiques : Inhibiteurs de la monoamine oxydase de type B (IMAO-B)
SERTRALINE 25 et 100 mg (Zoloft)	ZOLOFT	GELULE		NON	A prendre pendant les repas. Pfizer 04-08-2020 : ouverture déconseillé car hors-AMM. Pas d'étude.		Antidépresseurs : Inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS)
SEVELAMER 800 mg (Renagel, Renvela)	RENAGEL RENVELA	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas.	Poudre pour suspension buvable	Tous autres médicaments : Médicaments de l'hyperkaliémie et l'hyperphosphorémie
SILDENAFIL 20, 25, 50 et 100 mg (Revatio, Viagra)	VIAGRA	COMPRIME		NON	A prendre environ 1h avant l'activité. Eviter le jus de pamplemousse. La poudre pour suspension buvable est destinée à traitée l'HTAP	Poudre pour suspension buvable, comprimés orodispersibles	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus : Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection
SIMVASTATINE 20 et 40 mg (Zocor)	ZOCOR	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre le soir. Eviter le jus de pamplemousse. MSD 19-09-2020 : écrasement possible si administration immédiate. Le pelliculage masque le goût amer.		Agents réduisant les lipides sériques, non associés : Inhibiteurs de l'HMG-CoA reductase (statines)
SIROLIMUS 0,5 ; 1 et 2 mg (Rapamune)	RAPAMUNE	COMPRIME		NON	A prendre pendant ou hors des repas, mais de façon constante. Eviter le jus de pamplemousse.	Solution buvable ⚠ Adaptation posologique ⚠	Immunosuppresseurs sélectifs
SITAGLIPTINE 50 et 100 mg (Januvia, Xeluvia)	JANUVIA XELEVIA	COMPRIME		NON			Hypoglycémiantes autres que les insulines : Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)
SOFOSBUVIR 400 mg (Sovaldi)	SOVALDI	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Mauvais goût. Gilead 02-03-2022 : écrasement et fractionnement déconseillés car pas d'étude et goût très amer si broyé.		Antiviraux à action directe

SOLIFENACINE 5 et 10 mg (Vesicare)	VESICARE	COMPRIME		NON		Suspension buvable	Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus Antispasmodiques urinaires
SOTALOL 80 et 160 mg (Sotalex)	SOTALEX	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le matin. Cheplapharm 14-03-2022 : écrasement possible, produit soluble dans l'eau.		Bêta-bloquants
SPIRAMYCINE 3 MUI (Rovamycine)	ROVAMYCINE	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Sanofi 19-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Macrolides, lincosamides et streptogramines : macrolides
SPIRONOLACTONE 25, 50 et 75 mg (Aldactone)	ALDACTONE	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé et mis en suspension, de préférence dans un liquide sucré. Pfizer 04-08-2020 : cf. RCP. Très peu hydrosoluble. Goût amer.		Diurétiques épargneurs potassiques : antagonistes de l'aldostérone
SUCRALFATE 1 g (Keal)	KEAL	COMPRIME SECABLE		OUI	Peut être écrasé dans un peu d'eau.	Suspension buvable	Médicaments pour ulcère peptidique et le reflux gastro-oesophagien : Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires
SULBUTIAMINE 200 mg (Arcalion)	ARCALION	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas le matin et le midi. Servier 28-02-2022 : cf. RCP		Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12 : Vitamine B1, non associée
SULFADIAZINE 500 mg (Adiazine)	ADIAZINE	COMPRIME		OUI	Peut être écrasé et mélangé à un aliment (jus de fruit, yaourt, purée...). Goût amer.		Sulfamides et triméthoprim : Sulfamides de demi-vie intermédiaire
SULFAMETHOXAZOLE / TRIMETHOPRIME 400/80 et 800/160 mg (Cotrimoxazole, Bactrim, Bactrim Forte)	COTRIMOXAZOLE BACTRIM BACTRIM FORTE	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Eumedica 02-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Suspension buvable	Sulfamides et triméthoprim Associations de sulfamidés et de triméthoprim, y compris des dérivés
SULFASALAZINE 500 mg (Salazopyrine)	SALAZOPYRINE	COMPRIME GR		NON	A prendre de préférence après les repas. En attente (Pfizer)		Anti-inflammatoires intestinaux : Acide aminosalicilyque et dérivés
SULFATE FERREUX / ACIDE ASCORBIQUE 50/30 mg (Timoferol)	TIMOFEROL	COMPRIME GR		NON	A prendre de préférence le matin avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.	Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyféron)	Préparations martiales : Préparations orales de fer bivalent
SULFATE FERREUX / ACIDE ASCORBIQUE 50/30 mg (Timoferol)	TIMOFEROL	GELULE		NON	A prendre de préférence le matin avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.	Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyféron)	Préparations martiales : Préparations orales de fer bivalent
SULFATE FERREUX / ACIDE FOLIQUE 50 mg / 350 µg (Tardyferon B9) HAD-RP-DOC12-V1	TARDYFERON B9	COMPRIME		NON	A prendre de préférence avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.	Solution buvable de sulfate ferreux seul (Tardyféron)	Préparations martiales : Fer associé à l'acide folique

Date d'application : 03/04/2023

SULFATE FERREUX 50 et 80 mg (<i>Tardyferon</i>)	TARDYFERON	COMPRIME		NON	A prendre de préférence avant les repas, ou pendant selon la tolérance digestive. Eviter le thé.	Solution buvable	Préparations martiales : Fer associé à l'acide folique
SULINDAC 100 et 200 mg (<i>Arthrocline</i>)	ARTHROCINE	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas.		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens : Dérivés de l'acide acétique et apparentés
SULPIRIDE 200 mg (<i>Dogmatil</i>)	DOGMATIL	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable	Antipsychotiques : Benzamides
SULPIRIDE 50 mg (<i>Dogmatil</i>)	DOGMATIL	GELULE		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude	Solution buvable	Antipsychotiques : Benzamides
SULTIAME 50 et 200 mg (<i>Ospolot</i>)	OSPOLOT	COMPRIME		NON			Antiépileptiques
SUMATRIPTAN 50 mg (<i>Imigrane</i>)	IMIGRANE	COMPRIME		NON	Peut être dissout sans l'écraser dans un peu d'eau. A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible. Goût amer.	Solution pour pulvérisation nasale	Antimigraineux : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1
TACROLIMUS 0,5 ; 1, 2 et 5 mg (<i>Adoport, Prograf</i>)	ADOPORT PROGRAF	GELULE		OUI	Si nécessaire le contenu de la gélule peut être dispersé dans de l'eau (⚠ PA cytotoxique : protection du manipulateur requise). A prendre à jeun ≥ 1h avant ou ≥ 2h après le repas. Eviter le jus de pamplemousse.	Granulés pour suspension buvable	Immunosuppresseurs : Inhibiteurs de la calcineurine
TACROLIMUS LP 0,5 ; 0,75 ; 1, 2, 3, 4 et 5 mg (<i>Advagraf, Conferoport, Envarsus</i>)	ADVAGRAF CONFEROPORT ENVARBUS	GELULE LP		NON	PA cytotoxique. A prendre à jeun ≥ 1h avant ou ≥ 2h après le repas. Eviter le jus de pamplemousse.	⚠ Non LP ⚠ Granulés pour suspension buvable	Immunosuppresseurs : Inhibiteurs de la calcineurine
TADALAFIL 2,5 ; 5, 10 et 20 mg (<i>Adcirca, Cialis</i>)	ADCIRCA CIALIS	COMPRIME		NON	A prendre ≥ 30 min avant l'activité. Eviter le jus de pamplemousse.		Autres médicaments urologiques, antispasmodiques inclus : Médicaments utilisés dans les troubles de l'érection
TAMOXIFENE 10 et 20 mg (<i>Nolvadex</i>) HAD-RP-DOC12-V1	NOLVADEX	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON Date d'application : 03/04/2023	PA cytotoxique. AstraZeneca 02-10-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Photosensible.		Antihormones et apparentés : Anti-oestrogènes

TAMSULOSINE LP 0,4 (Omexel LP, Mecir LP)	OMEXEL LP MECIR LP	COMPRIME LP		NON	A prendre à heure fixe. 'Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate : Alpha-bloquants
TAMSULOSINE LP 0,4 (Omix LP)	OMIX LP	GELULE LP		NON	A prendre à heure fixe après un repas consistant, de préférence le matin. Astellas Pharma 14-03-2022 : cf. RCP		Médicaments de l'hypertrophie bénigne de la prostate : Alpha-bloquants
TELMISARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 40/12,5 ; 80/12,5 et 80/25 mg (Pritorplus)	PRITORPLUS	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Bayer 21-02-2022 : écrasement déconseillé car photosensible.		Antagonistes de l'angiotensine II en associations : Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques
TELMISARTAN 20, 40 et 80 mg (Micardis, Pritor)	MICARDIS PRITOR	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe. Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Sensible à l'humidité et à l'oxydation.		Antagonistes de l'angiotensine II non associés
TEMOZOLOMIDE 5, 20, 100, 140, 180 et 250 mg (Temodal)	TEMODAL	GELULE		NON	PA cytotoxique. A prendre à jeun et à distance des repas, de préférence à heure fixe.		Alkylants
TENOFOVIR 123, 163, 204 et 245 mg (Viread)	VIREAD	COMPRIME		OUI	A prendre pendant les repas. Peut être écrasé ou délité dans ≥ 100 mL d'eau, de jus d'orange ou de raisin pour administration immédiate.	Granulés	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique
TENOXICAM 20 mg (Tilcotil)	TILCOTIL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre pendant les repas. En attente (Viatrix)		Anti-inflammatoires et anti-rhumatismaux non stéroïdiens :Oxicams
TERBINAFINE 250 mg (Lamisil)	LAMISIL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à heure fixe, de préférence pendant les repas. Novartis 16-03-2022 : cf. RCP		Antifongiques à usage systémique
TERTATOLOL 5 mg (Artex)	ARTEX	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre le matin. Servier 28-02-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Bêta-bloquants non sélectifs
THALIDOMIDE 50 mg (génériques)	GENERIQUES	GELULE		NON	PA cytotoxique et tératogène. A prendre de préférence le soir. Bristol Myers Squibb 28-02-2022 : cf. RCP		Immunosuppresseurs
THEOPHYLLINE LP 50, 100, 200 et 300 mg (Dilatrane LP)	DILATRANE LP	GELULE LP		NON		Sirop	Autres médicaments systémiques pour les syndromes obstructifs des voies respiratoires :Xanthines
THIAMINE 250 mg (Benerva, Bevitine)	BENERVA BEVITINE	COMPRIME		NON			Vitamine B1 associée ou non avec les vitamines B6 et/ou B12 : Vitamine B1, non associée
THIOLCHICOSIDE 4 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	<u>Arrow 15-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude.		Myorelaxants à action centrale

THIOLCHOLCHOSIDE 4 mg (Miorel)	MIOREL	GELULE		NON	<u>DB Pharma 21-02-2022</u> : ouverture déconseillée car pas d'étude		Myorelaxants à action centrale
THIOGUANINE 40 mg (Lanvis)	LANVIS	COMPRIME SECABLE		NON	PA cytotoxique. ASPEN Pharma 22-02-2022 : des protocoles existent pour réaliser des solutions à partir des comprimés, en suivant les précautions d'usage de manipulation des produits cytotoxiques.		Antimétabolites : Analogues de la purine
TIANEPTINE 12,5 mg (Stablon)	STABLON	COMPRIME		NON	A prendre au début des repas. Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude		Antidépresseurs
TIAPRIDE 100 mg (Tiapridal)	TIAPRIDAL	COMPRIME SECABLE		NON	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc écrasement déconseillé. Hydrosoluble.	Solution buvable	Antipsychotiques : Benzamides
TICAGRELOR 90 mg (Brilique)	BRILIQUE	COMPRIME		OUI	Peut être écrasé et mélangé à ½ verre d'eau et bu immédiatement. Eviter le jus de pamplemousse.	Comprimés orodispersibles	Antithrombotiques Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines
TICLOPIDINE 250 mg (Ticlid)	TICLID	COMPRIME		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antithrombotiques Inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire sauf héparines
TIPRANAVIR 250 mg (Aptivus)	APTIVUS	CAPSULE MOLLE		NON	A prendre pendant les repas. Boehringer Ingelheim 24-02-2022 : cf. RCP		Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de protéase
TOLVAPTAN 15, 30, 60, 90 et 120 mg (Jinarc)	JINARC	COMPRIME		NON	La 1ère dose (la plus forte) est à prendre le matin ≥ 30 min avant le repas. La 2ème dose peut être prise pendant ou en dehors des repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Autres diurétiques : Antagonistes de la vasopressine
TOPIRAMATE 15, 25 et 50 mg (Epileptomax)	EPITOMAX	GELULE		OUI	Peut être ouvert et réparti sur une cuillère à café de nourriture semi-solide de n'importe quel type. Administration immédiate. Goût amer.		Antiépileptiques
TOPIRAMATE 25, 50, 100 et 200 mg (Epileptomax)	EPITOMAX	COMPRIME		NON	Goût amer.	Gélules ouvrables	Antiépileptiques
TRAMADOL 50 mg (Contramal, Topalgic)	CONTRAMAL TOPALGIC	COMPRIME		NON	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc écrasement déconseillé. Hydrosoluble et goût amer.	Comprimés effervescents, comprimés orodispersibles, solution buvable	Opioides

TRAMADOL 50 mg (Contramal, Topalgic)	CONTRAMAL TOPALGIC	GELULE		NON	<u>Sanofi 14-08-2020</u> : pas d'étude donc ouverture déconseillée. Hydrosoluble et amer.	Comprimés effervescents, comprimés orodispersibles, solution buvable	Opioides
TRAMADOL LP 50, 100, 150 et 200 mg (Zamudol LP)	ZAMUDOL LP	GELULE LP		OUI	Peut être ouvert dans une cuillère. A avaler à l'aide d'un verre d'eau. Ne pas écraser les granulés	Pas d'équivalent LP	Opioides
TRAMADOL LP 50, 100, 150, 200 et 300 mg (Contramal LP, Monoalgic LP, Topalgic LP, Zamudol LP)	CONTRAMAL LP TOPALGIC LP ZAMUDOL LP	COMPRIME LP		NON		Gélules LP ouvrables	Opioides
TRANDOLAPRIL / VERAPAMIL LP 180/2, 240/2 et 240/4 mg (Tarka LP)	TARKA LP	COMPRIME LP		NON	A prendre le matin de préférence à heure fixe, environ 30 min avant le repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine en associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion et inhibiteurs des canaux calciques
TRANDOLAPRIL 0,5 ; 2 et 4 mg (Odrik)	ODRIK	GELULE		?	En attente (Viatris)		Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC), sauf associations : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine sans association
TRIAMTERENE / HYDROCHLOROTHIAZIDE 50/25 mg (Prestole)	PRESTOLE	GELULE		?	A prendre le matin. En attente (Almirall)		Diurétiques et épargneurs potassiques en association : Diurétiques low-ceiling et épargneurs potassiques
TRICLABENDAZOLE 250 mg (Egaten)	EGATEN	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre de préférence pendant ou après un repas. Peut être écrasé et mélangé à de la nourriture semi-solide.		Antitrimatodes
TRIHXYPHENIDYLE 2 et 5 mg (Artane, Trihexy)	ARTANE TRIHEXY	COMPRIME		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable	Anticholinergiques : Amines tertiaires
TRIHXYPHENIDYLE LP 2 et 5 mg (Parkinane LP)	PARKINANE LP	GELULE LP		NON		⚠ Non LP ⚠ Solution buvable	Anticholinergiques : Amines tertiaires
TRIMEBUTINE 100 et 200 mg (Debridat, Debricarm, Transacalm)	DEBRIDAT DEBRICARM TRANSACALM	COMPRIME		?	En attente (Pfizer)	Granulés pour suspension buvable	Médicaments en cas de troubles fonctionnels gastro-intestinaux : Anticholinergiques synthétiques, esters d'amines tertiaires
TRIMETAZIDINE 20 mg (Vastarel, Vastarel V1)	VASTAREL	COMPRIME		NON Date d'application : 03/04/2023	A prendre pendant les repas. Servier 28-02-2022 : broyage déconseillé car pas d'étude		Autres médicaments pour le cœur

TRIMETAZIDINE LM 35 mg (<i>Vastarel LM</i>)	VASTAREL LM	COMPRIME LM		NON	A prendre pendant les repas. Servier 28-02-2022 : non écrasable car forme à libération modifiée		Autres médicaments pour le cœur
TRIMIPRAMINE 25 et 100 mg (<i>Surmontil</i>)	SURMONTIL	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre de préférence le soir. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Solution buvable	Antidépresseurs : Inhibiteurs non-sélectifs de la recapture des monoamines
TROPATEPINE 10 mg (<i>Lepticur</i>)	LEPTICUR	COMPRIME		OUI	<u>Laboratoires Delbert 14-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude, mais possible en cas de nécessité uniquement.		Anticholinergiques : Amines tertiaires
TROSPIMUM 20 mg (<i>Ceris</i>)	CERIS	COMPRIME		NON	A prendre à jeun avant un repas.		Antispasmodiques urinaires
URAPIDIL LP 30 et 60 mg (<i>Eupressyl LP, Mediatensyl LP</i>)	EUPRESSYL LP MEDIATENSYL LP	GELULE LP		NON	A prendre pendant les repas matin et soir. Cheplapharm 14-03-2022 : cf. RCP		Antiagrégants agissant en périphérie : Alpha-bloquants
VALACICLOVIR 500 mg (<i>Zelitrex</i>)	ZELITREX	COMPRIME		NON	<u>GSK 02-10-2020</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antiviraux à action directe : Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse
VALGANCICLOVIR 450 mg (<i>Roalcyte</i>)	ROALCYTE	COMPRIME		NON	PA cytotoxique. A prendre pendant les repas.	Poudre pour suspension buvable	Antiviraux à action directe : Nucléosides et nucléotides sauf inhibiteurs de la transcriptase inverse
VALPROATE 200, 250 et 500 mg (<i>Depakine, Depakote</i>)	DEPAKINE DEPAKOTE	COMPRIME GR		NON	Médicament à marge thérapeutique étroite	Solution buvable, sirop	Antiépileptiques : Dérivés d'acides gras
VALPROATE LP 100, 250, 500, 750 et 1000 mg (<i>Micropakine LP</i>)	MICROPAKINE LP	GRANULES LP		NON	A saupoudrer sur un aliment mou ou une boisson, froid ou à température ambiante (yaourt, jus d'orange, compote...). Administration immédiate. A prendre de préférence au cours des repas. Médicament à marge thérapeutique étroite	⚠ Non LP ⚠ Solution buvable, sirop	Antiépileptiques : Dérivés d'acides gras
VALPROATE LP 500 mg (<i>Depakine chrono</i>)	DEPAKINE CHRONO	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence au cours des repas. Médicament à marge thérapeutique étroite	Granulés LP	Antiépileptiques : Dérivés d'acides gras
VALPROMIDE 300 mg (<i>Depamide</i>)	DEPAMIDE	COMPRIME GR		NON	<u>Sanofi 23-03-2022</u> : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antiépileptiques : Dérivés d'acides gras

VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE 80/12,5 ; 160/12,5 et 160/25 mg (Cotareg)	COTAREG	COMPRIME		NON	A prendre à heure fixe, de préférence le matin. Biogaran 19-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude		Antagonistes de l'angiotensine II et diurétiques
VALSARTAN 40, 80 et 160 mg (Tareg)	TAREG	COMPRIME OU COMPRIME SECABLE		NON	A prendre à heure fixe. Biogaran 19-08-2020 : écrasement déconseillé car pas d'étude. Peu hydrosoluble et amer.	Solution buvable	Antagonistes de l'angiotensine II non associés
VENLAFAXINE 50 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME		NON	En attente (Viatris)		Autres antidépresseurs
VENLAFAXINE LP 150 et 225 mg (génériques)	GENERIQUES	COMPRIME LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas.		Autres antidépresseurs
VENLAFAXINE LP 37,5 ; 75 et 150 mg (Effexor LP)	EFFEXOR LP	GELULE LP		NON	A prendre à heure fixe pendant les repas. Pfizer 04-08-2020 : la gélule n'est qu'un excipient. Une étude interne montre la possibilité de mélanger les microgranules à une compote, à avaler immédiatement.	Comprimés LP	Autres antidépresseurs
VERAPAMIL 120 mg (Isoptine)	ISOPTINE	GELULE		NON	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques cardiosélectifs :Dérivés de la phénylalkylamine
VERAPAMIL 40 et 120 mg (Isoptine)	ISOPTINE	COMPRIME		NON	A prendre pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques cardiosélectifs :Dérivés de la phénylalkylamine
VERAPAMIL LP 240 mg (génériques)	GENERIQUES	GELULE LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse. Teva 01-03-2022 : ouverture déconseillée car pas d'étude. Sensible à l'humidité.		Inhibiteurs calciques cardiosélectifs :Dérivés de la phénylalkylamine
VERAPAMIL LP 240 mg (Isoptine LP)	ISOPTINE LP	COMPRIME SECABLE LP		NON	A prendre de préférence pendant les repas. Eviter le jus de pamplemousse.		Inhibiteurs calciques cardiosélectifs :Dérivés de la phénylalkylamine
VIGABATRINE 500 mg (Sabril)	SABRIL	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant ou après les repas. Sanofi 23-03-2022 : écrasement déconseillé car pas d'étude	Granulés pour solution buvable	Antiépileptiques : Dérivés d'acides gras
VILDAGLIPTINE 50 mg (Galvus)	GALVUS	COMPRIME		NON			Hypoglycémiantes autres que les insulines : Inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4)

VINORELBINE 20 et 30 mg (<i>Navelbine</i>)	NAVELBINE	CAPSULE MOLLE		NON	PA cytotoxique. A prendre de préférence en fin d'un repas léger ou d'une collation. Ne pas prendre avec une boisson gazeuse. Pierre Fabre 21-02-2022 : PA irritant		Vinca-alcaloïdes et analogues
VORICONAZOLE 50 et 200 mg (<i>Vfend</i>)	VFEND	COMPRIME		NON	A prendre ≥ 1h avant ou après un repas.	Suspension buvable	Antimycosiques à usage systémique : dérivés triazolés
WARFARINE 2 et 5 mg (<i>Coumadine</i>)	COUMADINE	COMPRIME SECABLE		OUI	A prendre à heure fixe, de préférence le soir. BMS 19-08-2020 : 2 études mentionnent la stabilité de la Coumadine écrasée en suspension. Médicament à marge thérapeutique étroite	Suspension buvable (AAC)	Antithrombotiques : Antivitamines K
ZIDOVUDINE 100 et 250 mg (<i>Retrovir</i>)	RETROVIR	GELULE		NON		Solution buvable	Antiviraux à action directe : Inhibiteurs de la transcriptase inverse nucléosidique et nucléotidique
ZINC GLUCONATE 15 mg (<i>Effizinc, Rubozinc</i>)	EFFIZINC RUBOZINC	GELULE		NON	A prendre à distance des repas, si possible ≥ 2h, en position assise avec un grand verre d'eau. Ne pas s'allonger jusqu'à 30 min après la prise.		Anti-acnéiques à usage systémique
ZOLMITRIPTAN 2,5 mg (<i>Zomig</i>)	ZOMIG	COMPRIME		NON	A prendre pendant la crise de migraine uniquement, de préférence le plus tôt possible.	Comprimés orodispersibles	Antimigraineux : Agonistes sélectifs des récepteurs 5-HT1
ZOLPIDEM 10 mg (<i>Stilnox</i>)	STILNOX	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant le coucher. Sanofi 14-08-2020 : aucune étude donc écrasement déconseillé car le pelliculage protège le PA de la lumière et de l'oxydation. Médicament à marge thérapeutique étroite	Comprimé sublingual	Hypnotiques et sédatifs : Apparentés aux benzodiazépines
ZOPICLONE 3,75 et 7,5 mg (<i>Imovane</i>)	IMOVANE	COMPRIME SECABLE		NON	A prendre avant le coucher. Sanofi 14-08-2020 : aucune étude donc écrasement déconseillé. Le pelliculage masque le goût. Photosensible et hydrosoluble.		Hypnotiques et sédatifs : Apparentés aux benzodiazépines
ZUCLOPENTHIXOL 10 et 25 mg (<i>Clopixol</i>)	CLOPIXOL	COMPRIME		OUI	<u>Lundbeck 14-03-2022</u> : Pas d'étude de stabilité mais écrasement et dissolution possible dans l'eau si administration immédiate. Goût amer.	Solution buvable en gouttes	Antipsychotiques : Dérivés du thioxanthène